Sotsiaalministri 10. septembri 2020. a määrus nr 41
"Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine"
Lisa
Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määrus nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu"
Lisa

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734768	abirateroon, 500mg	L02BX03	ZYTIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes on asümptomaatilised või kergelt sümptomaatilised peale ebaõnnestunud androgeenide deprivatsioonravi, ning kellel kemoteraapia ei ole veel kliiniliselt näidustatud ning heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda ravi ensalutamiidiga või abirateroonigа varasemas ravireas. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi abirateroonigа on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2019. a

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766662	adalimumab, 20mg 0.2ml	L04AB04	HUMIRA, süstelahus süstlis, 0.2ml 2TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1816398	adalimumab, 20mg 0.4ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus süstlis, 0.4ml 2TK	Sandoz GmbH	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I–III astme funktsionaalne

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10–30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI >=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1695090	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	HUMIRA, süstelahus süstlis, 0.4ml 2TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1715251	adalimumab, 40mg 0.4ml	L04AB04	HUMIRA, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742251	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	AMGEVITA, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	Amgen Europe B.V.	100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme funktsionaalne

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud
					100	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742295	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	AMGEVITA, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Amgen Europe B.V.	100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1777305	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	Sandoz GmbH	100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1777338	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	HYRIMOZ, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Sandoz GmbH	100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1792571	adalimumab, 40mg 0.8ml	L04AB04	IDACIO, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI >=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L73.2-L73.2	Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30	Oftalmoloog				ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta
1011429	adapaleen, 1mg 1g	D10AD03	DIFFERIN, geel, 30g 1TK	Galderma International	50						
1011430	adapaleen, 1mg 1g	D10AD03	DIFFERIN, kreem, 30g 1TK	Galderma International	50						
1412334	agomelatiin, 25mg	N06AX22	VALDOXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Les Laboratoires Servier	50						
1738469	agomelatiin, 25mg	N06AX22	ZILBEA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
1738762	agomelatiin, 25mg	N06AX22	AGOMELATINE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan S.A.S	50						
1738919	agomelatiin, 25mg	N06AX22	AGOMELATINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
1763872	agomelatiin, 25mg	N06AX22	LAMEGOM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka, d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1590106	aklidiinium, 322mcg 1annust	R03BB05	BRETARIS GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1593312	aksitiniib, 1mg	L01XE17	INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1593345	aksitiniib, 5mg	L01XE17	INLYTA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1739437	alektiniib, 150mg	L01XE36	ALECENSA, kõvakapsel, 224TK	Roche Registration GmbH	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1240120	alendroonhape, 70mg	M05BA04	SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1245338	alendroonhape, 70mg	M05BA04	ALENOTOP, tablett, 4TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1339141	alendroonhape+kolekaltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	FOSAVANCE, tablett, 4TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1695067	alendroonhape+kolekaltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL ZENTIVA, tablett, 4TK	Zentiva, k.s.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696204	alendroonhape+kolekaltsiferool, 70mg+5600RÜ	M05BB03	ALENDRONIC ACID/ COLECALCIFEROL SANDOZ, tablett, 4TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1207493	alfadarbepoetiin, 100mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Nefroloog, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
1207527	alfadarbepoetiin, 150mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1176218	alfadarbepoetiin, 20mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207314	alfadarbepoetiin, 30mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207370	alfadarbepoetiin, 40mcg 0.4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1207415	alfadarbepoetiin, 50mcg 0.5ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Pediaater, Uroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1207437	alfadarbepoetiin, 60mcg 0.3ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1207471	alfadarbepoetiin, 80mcg 0.4ml	B03XA02	ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK	Amgen Europe B.V.	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1022960	alfadornaas, 1mg 1ml	R05CB13	PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1704260	alfaefmoroktokog, 1000RÜ	B02BD83	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1704271	alfaefmoroktokog, 1500RÜ	B02BD83	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1704282	alfaefmoroktokog, 2000RÜ	B02BD83	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1704237	alfaefmoroktokog, 250RÜ	B02BD83	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704293	alfaefmoroktokog, 3000RÜ	B02BD83	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1704248	alfaefmoroktokog, 500RÜ	B02BD83	ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Swedish Orphan Biovitrum AB	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1644904	alfafollitropiin, 150RÜ 0.25ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.25ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1644915	alfafollitropiin, 225RÜ 0.375ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.375ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1173855	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1628636	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 0.5ml 1TK	Theramex Ireland Limited	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1644926	alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1213513	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 0.75ml 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1628647	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 0.75ml 1TK	Theramex Ireland Limited	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1644937	alfafollitropiin, 450RÜ 0.75ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.75ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1035784	alfafollitropiin, 75RÜ	G03GA05	GONAL-F, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1644892	alfafollitropiin, 75RÜ 0.125ml	G03GA05	BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.125ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1173866	alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml	G03GA05	GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 1.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1628658	alfafollitropiin, 900RÜ 1.5ml	G03GA05	OVALEAP, süstelahus, 1.5ml 1TK	Theramex Ireland Limited	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1327834	alfafollitropiin+alfalutropiin, 150RÜ+75RÜ	G03GA30	PERGOVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	50						
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
1580969	alfakooriongonadotropiin, 250mcg 0.5ml	G03GA08	OVITRELLE, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1046810	alfalutropiin, 75RÜ	G03GA07	LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1657593	alfasimoktokog, 1000RÜ	B02BD81	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1657571	alfasimoktokog, 250RÜ	B02BD81	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1657582	alfasimoktokog, 500RÜ	B02BD81	NUWIQ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Octapharma AB	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1633508	alfaturoktokog, 1000RÜ	B02BD80	NOVOEIGHT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1064247	alfusosiin, 10mg	G04CA01	XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1278176	alfusosiin, 10mg	G04CA01	ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1001619	allopurinool, 100mg	M04AA01	ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1685505	allopurinool, 100mg	M04AA01	ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1001686	allopurinool, 300mg	M04AA01	ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1685628	allopurinool, 300mg	M04AA01	ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10, N20-N23					
1064517	amantadiin, 100mg	N04BB01	AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1349872	ambrisentaan, 10mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349850	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1774975	ambrisentaan, 5mg	C02KX02	AMBRISENTAN NORAMEDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UAB Norameda	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
7017780	aminohapped,		Neocate Junior, pulber, 400g N4	Nutrimedical OÜ	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2	Pediaater		1,00	2,00	lehmapiimavalgu talumatusega 1-2-aastastele lastele, kes on esimesel eluaastal tarvitanud aminohapete segu ning kes täielikult hüdrolüüsitud piimasegu ei talu. Jätkuv vajadus aminohapete segule peab olema tõestatud preparaadi esmasel määramisel ja 6 kuu möödudes
1016244	amiodaroon, 200mg	C01BD01	CORDARONE 200 MG, tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1044616	amiodaroon, 200mg	C01BD01	AMIOKORDIN, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1041141	amisulpriid, 200mg	N05AL05	SOLIAN, tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1342213	amisulpriid, 200mg	N05AL05	AMISAN 200 MG, tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1343438	amisulpriid, 400mg	N05AL05	AMISAN 400 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1107391	amitriptüliin, 10mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	AS Grindeks	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1012475	amitriptüliin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	AS Grindeks	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
					50						
1068634	amitriptüliin, 25mg	N06AA09	AMITRIPTYLINE NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
1087905	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLOCARD 10MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1109900	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AGEN 10MG, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1122972	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1147003	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1241514	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIGAMMA 10MG, tablett, 30TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1243088	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLOCARD 10MG, tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1318946	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1318980	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE TEVA, tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1445396	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1445408	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 60TK	VITABALANS OY	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1445419	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK	VITABALANS OY	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1525665	amlodipiin, 10mg	C08CA01	AMLODIPINE ACCORD 10MG, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1551406	amlodipiin, 10mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1087871	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1109775	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1109887	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AGEN 5MG, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1122961	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1241424	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1242863	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLOCARD 5 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1318834	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1318878	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE TEVA, tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1416899	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1445284	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1445295	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 60TK	VITABALANS OY	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1445307	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK	VITABALANS OY	75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
					50						
1525597	amlodipiin, 5mg	C08CA01	AMLODIPINE ACCORD 5MG, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1551383	amlodipiin, 5mg	C08CA01	HIPRES, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, I20-I20					
1008919	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1066058	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1066463	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1306921	amoksitsilliin, 1000mg	J01CA04	OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1000551	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1066047	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	AMOXICILLIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1066496	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1306820	amoksitsilliin, 500mg	J01CA04	OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1000382	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM TS, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1182002	amoksitsilliin, 50mg 1ml	J01CA04	OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Sandoz GmbH	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1000450	amoksitsilliin, 750mg	J01CA04	AMOXICILLIN-RATIOPHARM 750 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	
1028630	amoksitsilliin+klavulaanhape, 500mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
1066722	amoksitsilliin+klavulaanhape, 500mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
1635139	amoksitsilliin+klavulaanhape, 500mg+125mg	J01CR02	BETAKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
					50						
1028685	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
					50						
1066711	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AMOKSIKLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1701155	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	MEDOCLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	Medochemie Limited	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
					50						
1718333	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN FRUIT, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	GlaxoSmithKline Eesti OÜ	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
					50						
1770948	amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml	J01CR02	AUGMENTIN, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK	First Pharma OÜ	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
					50						
1066700	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
1066733	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
1175431	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOKSIKLAV, dispergeeruv/suus dispergeeruv tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
1635230	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	BETAKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1660474	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Actavis Group PTC ehf	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
					50						
1723092	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	First Pharma OÜ	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
1743971	amoksitsilliin+klavulaanhape, 875mg+125mg	J01CR02	MEDOCLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsilliniga
1009572	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Galderma International	50						
1736580	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	EXOLORFIN, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1740866	amorolfiin, 50mg 1ml	D01AE16	LOCERYL, ravimküünelakk, 2.5ml 1TK	Globalex Pharma OÜ	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1208359	anagreliid, 0,5mg	L01XX35	XAGRID, kõvakapsel, 100TK	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited	100	D47.3-D47.3	Hematoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüuurea annuses vähemalt 2g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfainterferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnenud trombohemorraagilised juhud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1765649	anagreliid, 0,5mg	L01XX35	ANAGRELIDE MYLAN, kõvakapsel, 100TK	Mylan S.A.S	100	D47.3-D47.3	Hematoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüuurea annuses vähemalt 2g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfainterferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnenud trombohemorraagilised juhud
1033546	anastrosool, 1mg	L02BG03	ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1240490	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB SanoSwiss	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1244438	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE-TEVA 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1293870	anastrosool, 1mg	L02BG03	ANASTROZOLE ACCORD 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299023	anastrosool, 1mg	L02BG03	AXASTROL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AS Grindeks	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1531437	apiksabaan, 2,5mg	B01AF02	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
1531448	apiksabaan, 2,5mg	B01AF02	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	75	I48-I48					
					50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
1603741	apiksabaan, 5mg	B01AF02	ELIQUIS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	50						
					75	I48-I48					
1504808	apomorfiin, 10mg 1ml	N04BC07	APO-GO, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Stada Arzneimittel AG	100	G20-G20	Neuroloog				konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb >40%)
1649796	aripiprasool, 10mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1203578	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ABILIFY, tablett, 28TK	Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1649370	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE ACCORD HEALTHCARE, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1649651	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE TEVA, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1649853	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ZYKALOR, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1650271	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARISPPA, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1691962	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE ZENTIVA, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1703630	aripiprasool, 15mg	N05AX12	ARIPIPRAZOLE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1650349	aripiprasool, 30mg	N05AX12	ARISPPA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1004500	asatiopriin, 50mg	L04AX01	IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	L12-L12, L13.0-L13.0, L10-L10	Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1667325	asatiopriin, 50mg	L04AX01	ATSIMUTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Bausch Health Ireland Limited	75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L12-L12, L13.0-L13.0, L10-L10	Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog				
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
1005736	aselaiinhape, 200mg 1g	D10AX03	SKINOREN, kreem, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1019809	asitromütsiin, 20mg 1ml	J01FA10	SUMAMED, suukaudse suspensiooni pulber, 20ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1019775	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	SUMAMED, kõvakapsel, 6TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1614439	asitromütsiin, 250mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	Krka d.d. Novo mesto	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1168130	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 15ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1267309	asitromütsiin, 40mg 1ml	J01FA10	SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1019797	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva Pharma B.V.	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1113398	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITROX 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1184992	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Sandoz GmbH	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1549548	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	AS Grindeks	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1563342	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	ZYLUMIT, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Rivopharm Ltd	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1614451	asitromütsiin, 500mg	J01FA10	AZITHROMYCIN KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1045796	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	NOVORAPID PENFILL, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1084788	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AD05	NOVOMIX 30 FLEXPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1092541	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	NOVORAPID FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1736917	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	FIASP, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1736940	aspart-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB05	FIASP, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1007851	atenolool, 100mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1007895	atenolool, 25mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1007873	atenolool, 50mg	C07AB03	ATENOLOL-RATIOPHARM 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610536	atomoksetiin, 10mg	N06BA09	ATOMINEX 10MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610615	atomoksetiin, 18mg	N06BA09	ATOMINEX 18MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud,

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610693	atomoksetiin, 25mg	N06BA09	ATOMINEX 25 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610772	atomoksetiin, 40mg	N06BA09	ATOMINEX 40 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1610851	atomoksetiin, 60mg	N06BA09	ATOMINEX 60 MG, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19-aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1138047	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1180213	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	TORVACARD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1397741	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	TULIP 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1410657	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1541911	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1707892	atorvastatiin, 10mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1138058	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1180235	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TORVACARD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1397909	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1397932	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1410792	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1542057	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1626140	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN ZENTIVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1708062	atorvastatiin, 20mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1220993	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1253887	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1410927	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1542192	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN TAD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	TAD Pharma GmbH	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1708220	atorvastatiin, 40mg	C10AA05	ATORVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1124996	atorvastatiin, 80mg	C10AA05	SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1768316	atorvastatiin+esetimiib, 10mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1768349	atorvastatiin+esetimiib, 20mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1768372	atorvastatiin+esetimiib, 40mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1768406	atorvastatiin+esetimiib, 80mg+10mg	C10BA05	TORZELIP, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1733767	atorvastatiin+perindopriil, 40mg+10mg	C10BX15	EUVASCOR, kõvakapsel, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1733677	atorvastatiin+perindopriil, 40mg+5mg	C10BX15	EUVASCOR, kõvakapsel, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
1039250	atsetüültsüsteiin, 600mg	R05CB01	ACC LONG, kihisev tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50	J84-J84					
1515248	atsetüültsüsteiin, 600mg	R05CB01	MUCOVIT, kihisev tablett, 12TK	PharmaEstica Manufacturing OÜ	50	J84-J84					
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
1165384	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1738289	atsikloviir, 400mg	J05AB01	ACIC 400 MG, tablett, 35TK	Globalex Pharma OÜ	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
1000731	atsitretiin, 10mg	D05BB02	NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK	Actavis Group PTC ehf	75	L40-L40, M07-M07, L86-L86, Q80-Q80, Q82.8-Q82.8	Pediaater, Dermatoveneroloog				
					50						
1019483	batsitratsiin+neomütsiin, 250RÜ+5000RÜ 1g	D06AX80	BANEOCIN, salv, 20g 1TK	Sandoz GmbH	50						
1117640	beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml	L03AB07	REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1430671	beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml	L03AB07	REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK	Merck Europe B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1591286	beeta-1a-interferoon, 60mcg 1ml	L03AB07	AVONEX PEN, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1657953	beeta-1a-peginterferoon, 125mcg 0.5ml	L03AB13	PLEGRIDY, süstelahus, 0.5ml 2TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1657975	beeta-1a-peginterferoon, 63mcg/94mcg 0.5ml	L03AB13	PLEGRIDY, süstelahus, 1TK / 1TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks
1071245	beeta-1b-interferoon, 250mcg 1ml	L03AB08	BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK	Bayer AG	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1361393	beeta-1b-interferoon, 300mcg	L03AB08	EXTAVIA, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK	Novartis Europharm Limited	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks
1205435	beetaepoetiin, 10000RÜ 0.6ml	B03XA80	NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1236912	beetahistiin, 16mg	N07CA01	BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	50	H81-H81					
1480878	beetahistiin, 16mg	N07CA01	VERTIMED 16MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	50	H81-H81					
1115738	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, tablett, 50TK	Mylan Healthcare SIA	50	H81-H81					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1480957	beetahistiin, 24mg	N07CA01	VERTIMED 24MG, tablett, 50TK	Medochemie Limited	50	H81-H81					
1515833	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETAHISTINE ACTAVIS, tablett, 50TK	Actavis Group PTC ehf	50	H81-H81					
1620245	beetahistiin, 24mg	N07CA01	BETASERC, suus dispergeeruv tablett, 60TK	Mylan IRE Healthcare Limited	50	H81-H81					
1004870	beetametasoon, 1mg 1g	D07AC01	BETNOVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1007514	beetametasoon+fusidiinhape, 1mg+20mg 1g	D07CC80	FUCICORT, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1062403	beetametasoon+salitsülhape, 0,5mg+20mg 1g	D07BC80	DIPROSALIC, nahalahus, 50ml 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
1034042	betaksolool, 2,5mg 1ml	S01ED02	BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA Novartis Baltics	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1012194	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca AB	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1258017	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1266173	bikalutamiid, 150mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1026560	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1257803	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265891	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMID ACTAVIS 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
					50						
1293791	bikalutamiid, 50mg	L02BB03	BICALUTAMIDE ACCORD 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1258983	bisoprolool, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1259029	bisoprolool, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
1596427	bisoprolool, 10mg	C07AB07	SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1683952	bisoprolool, 10mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1683794	bisoprolool, 2,5mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1258905	bisoprolool, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1258949	bisoprolool, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 100TK	VITABALANS OY	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1596326	bisoprolool, 5mg	C07AB07	SOBYCOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						
1683873	bisoprolool, 5mg	C07AB07	BISOPROLOL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, I47-I49					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586718	bosentaan, 125mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 125 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	UAB Norameda	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1628759	bosentaan, 125mg	C02KX01	BOSENTAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare B.V.	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586684	bosentaan, 62,5mg	C02KX01	BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	UAB Norameda	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1612055	bosutiniib, 100mg	L01XE14	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1612077	bosutiniib, 500mg	L01XE14	BOSULIF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2016. a.
1042782	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1581230	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	BRINZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA ELVIM	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1723047	brinsolamiid, 10mg 1ml	S01EC04	BRINZOLAMIDE SANDOZ, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657694	brinsolamiid+brimonidiin, 10mg+2mg 1ml	S01EC80	SIMBRINZA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1531459	bromofenak, 0,9mg 1ml	S01BC11	YELLOX, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1008098	bromokriptiin, 2,5mg	G02CB01	BROMOCRIPTIN-RICHTER, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	E24-E24, E22-E22	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1038316	budesoniid, 0,25mg 1ml	R03BA02	PULMICORT, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45					
					50						
1114827	budesoniid, 0,2mg 1annust	R03BA02	PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J45-J45					
					50						
1124390	budesoniid, 200mcg	R03BA02	MIFLONIDE BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	SIA Novartis Baltics	75	J45-J45					
					50						
1174160	budesoniid, 200mcg 1annust	R03BA02	GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
1124413	budesoniid, 400mcg	R03BA02	MIFLONIDE BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	SIA Novartis Baltics	50						
					75	J45-J45					
1174182	budesoniid, 400mcg 1annust	R03BA02	GIONA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK	Orion Corporation	50						
					75	J45-J45					
1011070	budesoniid, 50mcg 1annust	R01AD05	BUDESONID SANDOZ, ninasprei, suspensioon, 200annust 1TK	Sandoz GmbH	75	J30-J30				17,00	
					50						
1232660	bupropioon, 150mg	N06AX12	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50	F33-F33, F32-F32					
1232693	bupropioon, 300mg	N06AX12	ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50	F33-F33, F32-F32					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005006	busulfaan, 2mg	L01AB01	MYLERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Pediaater, Hematoloog, Onkoloog				
1343382	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 10TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
1343393	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I48-I48					
					50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
1343405	dabigatraaneteksilaat, 110mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I48-I48					
					75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
1538759	dabigatraaneteksilaat, 150mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I48-I48					
					50						
1343360	dabigatraaneteksilaat, 75mg	B01AE07	PRADAXA, kõvakapsel, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1624160	dabrafeniib, 75mg	L01XE23	TAFINLAR, kõvakapsel, 120TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning eelneva 3 ravikuu järel (ravi alustamisel) ja edaspidi 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dabrafeniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.01.2016.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1598654	dapagliflosiin, 10mg	A10BK01	FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1598609	dapagliflosiin, 5mg	A10BK01	FORXIGA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1275768	dasatiniib, 50mg	L01XE06	SPRYCEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dasatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1713956	deferasiroks, 180mg	V03AC03	EXJADE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1713989	deferasiroks, 360mg	V03AC03	EXJADE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	D57-D57, D47.1-D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)
1605574	degludek-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE06	TRESIBA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1605619	degludek-insuliin, 200ühik 1ml	A10AE06	TRESIBA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 3TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014972	deksametasoon, 0,5mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 10TK	Krka d.d. Novo mesto	100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					100	C00-D48					
					50						
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Pediaater, Dermatoveneroloog, Allergoloog-immunoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1647143	deksametasoon, 0,985mg 1g	S01BA01	DEXAGEL, silmageel, 5g 1TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
1007479	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA01	OFTAN DEXA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
1124288	deksametasoon, 1mg 1ml	S01BA01	MAXIDEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA Novartis Baltics	50						
1671780	deksametasoon, 20mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Krka d.d. Novo mesto	75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Allergoloog-immunoloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					100	C00-D48					
					50						
1792874	deksametasoon, 20mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	First Pharma OÜ	100	C00-D48					
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog-immunoloog				
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1671667	deksametasoon, 4mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	Krka d.d. Novo mesto	100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					100	C00-D48					
					50						
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
1792773	deksametasoon, 4mg	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK	First Pharma OÜ	75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
1008414	deksametasoon, 4mg 1ml	H02AB02	DEXAMETHASON KRKA, süstelahus, 1ml 25TK	Krka d.d. Novo mesto	100	C00-D48					
					50						
1044379	deksametasoon+kloor amfenikool, 1mg+2mg 1g	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA, silmasalv, 3.5g 1TK	Santen Oy	50						
1044368	deksametasoon+kloor amfenikool, 1mg+2mg 1ml	S01CA82	OFTAN DEXA-CHLORA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Santen Oy	50						
1124301	deksametasoon+neom ütsiin+polümüksiin B, 1mg+3500RÜ+6000R Ü 1ml	S01CA80	MAXITROL, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA Novartis Baltics	50						
1150276	deksametasoon+tobra mütsiin, 1mg+3mg 1g	S01CA81	TOBRADEX, silmasalv, 3.5g 1TK	SIA Novartis Baltics	50						
1124266	deksametasoon+tobra mütsiin, 1mg+3mg 1ml	S01CA81	TOBRADEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	SIA Novartis Baltics	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1481857	denosumab, 60mg 1ml	M05BX04	PROLIA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK	Amgen Europe B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)
					50						
1653937	desloratadiin, 0,5mg 1ml	R06AX27	DESLORATADINE SOPHARMA, suukaudne lahus, 120ml 1TK	Sopharma AD	50						
1550797	desloratadiin, 5mg	R06AX27	DASSELTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1554140	desloratadiin, 5mg	R06AX27	DESLORATADINE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1064348	desmopressiin, 10mcg 1annust	H01BA02	MINIRIN, ninasprei, lahus, 2.5ml 1TK	Ferring GmbH	50						
					100	E23.2-E23.2	Endokrinoloog, Pediaater	esmane			
1225594	desmopressiin, 120mcg	H01BA02	MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK	Ferring GmbH	100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					50						
1225561	desmopressiin, 60mcg	H01BA02	MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK	Ferring GmbH	50						
					100	E23.2-E23.2	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
1063303	desogestreel, 75mcg	G03AC09	CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1505450	desogestreel, 75mcg	G03AC09	DESIRETT 75 MCG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB Exeltis Baltics	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1656143	desogestreel, 75mcg	G03AC09	DELAMONIE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1062920	desogestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,02mg	G03AA09	NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1062931	desogestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA09	REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1161458	desogestreel+etünüülöstradiool, 25mcg+40mcg/125mcg+30mcg	G03AB05	GRACIAL, tablett, 21TK / 45TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1208045	detemir-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE05	LEVEMIR FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Novo Nordisk A/S	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1007659	diasepaam, 10mg 2.5ml	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1007682	diasepaam, 5mg 2.5ml	N05BA01	DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
1385276	dienogest, 2mg	G03DB08	VISANNETTE, tablett, 28TK	Bayer AG	75	N80-N80	Günekoloog				
					50						
1587146	dienogest+etünüülöstradiool, 0+0/2mg+0,03mg	G03AA16	SIBILLA PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1066834	dienogest+etünüülöstradiool, 2mg+0,03mg	G03AA16	JEANINE, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1305818	dienogest+etünüülöstradiool, 2mg+0,03mg	G03AA16	AMMILY 2 MG / 0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	UAB Orivas	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1070592	digoksiin, 0,25mg	C01AA05	DIGOXIN-GRINDEKS, tablett, 50TK	AS Grindeks	50						
					75	I50-I50					
1222209	digoksiin, 0,25mg	C01AA05	DIGOXIN NYCOMED 0,25 MG, tablett, 60TK	Takeda Pharma AS	75	I50-I50					
					50						
1222197	digoksiin, 62,5mcg	C01AA05	DIGOXIN NYCOMED 62,5 MCG, tablett, 60TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	I50-I50					
1361786	dihüdrokodeiin, 60mg	N02AA08	DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	50						
1016109	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					100	C00-D48					
1017133	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG, rektaalsuposiit, 10TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1032589	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLOMELAN RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1039632	diklofenak, 100mg	M01AB05	OLFEN DEPOCAPS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK	Teva B.V.	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1078163	diklofenak, 100mg	M01AB05	DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					100	C00-D48					
1594425	diklofenak, 100mg	M01AB05	NAKLOFEN SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1594436	diklofenak, 100mg	M01AB05	NAKLOFEN SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Krka d.d. Novo mesto	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1071920	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
1071942	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1072280	diklofenak, 150mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1032590	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOMELAN 50 MG, gastroresistentne tablett, 10TK	G.L. Pharma GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					50						
1072213	diklofenak, 50mg	M01AB05	DICLOFENAC-RATIOPHARM 50MG, gastroresistentne tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
1012048	diklofenak, 75mg	M01AB05	OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1071986	diklofenak, 75mg	M01AB05	DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1614372	diklofenak+omeprasool, 75mg+20mg	M01AB82	DICLOPRAM, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1031634	diltiaseem, 180mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					100	I27.0-I27.0					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1031645	diltiaseem, 90mg	C08DB01	DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					100	I27.0-I27.0					
1638693	dimetüülfumaraat, 120mg	L04AX07	TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon või glatirameeratsetaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1638705	dimetüülfumaraat, 240mg	L04AX07	TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Biogen Netherlands B.V.	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon või glatirameeratsetaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1028214	doksasosiin, 2mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1071391	doksasosiin, 2mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1028225	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA, tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1071379	doksasosiin, 4mg	C02CA04	KAMIREN, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1129799	doksasosiin, 4mg	C02CA04	CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Upjohn EESV	50						
1205895	doksasosiin, 4mg	C02CA04	DOXALFA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1018303	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYCYCLIN STADA, tablett, 10TK	Stada Arzneimittel AG	100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
					50						
1065877	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYCYCLINE VITABALANS, tablett, 10TK	VITABALANS OY	50						
					100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
1065899	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXYLAN, tablett, 10TK	G.L. Pharma GmbH	100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
					50						
1144976	doksütsükliin, 100mg	J01AA02	DOXY-M-RATIOPHARM 100 MG, tablett, 10TK	ratiopharm GmbH	100	A50-A53	Dermatoveneroloog				
					50						
1240366	domperidoon, 10mg	A03FA03	DOMPERIDON ACTAVIS, tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1324662	domperidoon, 10mg	A03FA03	OROPERIDYS 10 MG, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Pierre Fabre Medicament	50						
1292206	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1313053	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Orion Corporation	50						
1391217	donepesiil, 10mg	N06DA02	DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1453924	donepesiil, 10mg	N06DA02	YASNAL Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1292105	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1391116	donepesiil, 5mg	N06DA02	DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1453823	donepesiil, 5mg	N06DA02	YASNAL Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1014961	dorsolamiid, 2%	S01EC03	TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1420108	dorsolamiid, 20mg 1ml	S01EC03	DORZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA ELVIM	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1755480	dorsolamiid, 20mg 1ml	S01EC03	VIZIDOR, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1454093	dronedaroon, 400mg	C01BD07	MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	sanofi-aventis groupe	50		Kardioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni
1316090	drospirenoon+etünüülö stradiool, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA12	YAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK	Bayer AG	50						
1331378	drospirenoon+etünüülö stradiool, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA12	MARIONELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK / 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1453766	drospirenoon+etünüülö stradiool, 0+0/3mg+0,02mg	G03AA12	DAYLETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1220487	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer AG	50						
1330759	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	MADELEINE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1331019	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,02mg	G03AA12	JANGEE 0,02 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	UAB Exeltis Baltics	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1043536	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	YARINA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1331053	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	JANGEE 0,03 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	UAB Exeltis Baltics	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1331222	drospirenoon+etünüülö stradiool, 3mg+0,03mg	G03AA12	MADELEINE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1165711	drospirenoon+östradiol, 2mg+1mg	G03FA17	ANGELIQ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1670745	dulaglutiid, 1,5mg 0.5ml	A10BJ05	TRULICITY, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK	Eli Lilly Nederland B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1195624	duloksetiin, 30mg	N06AX21	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1660643	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
1661677	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE ACCORD, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1661701	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXGAMMA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
1670419	duloksetiin, 30mg	N06AX21	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1694921	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1699117	duloksetiin, 30mg	N06AX21	DULOXETINE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1195635	duloksetiin, 60mg	N06AX21	CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1660733	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1661699	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE ACCORD, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1661745	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXGAMMA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					75	G43-G43					
1670510	duloksetiin, 60mg	N06AX21	ONELAR, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Medochemie Limited	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1694954	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Zentiva, k.s.	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1699140	duloksetiin, 60mg	N06AX21	DULOXETINE SANDOZ, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1155440	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	AVODART, pehmekapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Eesti OÜ	50						
1539929	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	DUTASTERIDE TEVA, pehmekapsel, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1707241	dutasteriid, 0,5mg	G04CB02	DUTRYS, pehmekapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1054752	düdrogesteroon, 10mg	G03DB01	DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Mylan Healthcare SIA	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1013803	düdrogesteroon+östradiool, 0+1mg/10mg+1mg	G03FB08	FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1375332	düdrogesteroon+östradiool, 2,5mg+0,5mg	G03FA14	FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan IRE Healthcare Limited	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1082528	düdrogesteroon+östradiool, 5mg+1mg	G03FA14	FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1077937	ebastiin, 20mg	R06AX22	KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Almirall S.A.	50						
1691546	edoksabaan, 30mg	B01AF03	LIXIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Daiichi Sankyo Europe GmbH	50						
					75	I48-I48					
1691658	edoksabaan, 60mg	B01AF03	LIXIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Daiichi Sankyo Europe GmbH	75	I48-I48					
					50						
1020373	ekonasool, 150mg	G01AF05	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 3TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1039036	ekonasool, 50mg	G01AF05	GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 15TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1011148	eksemestaan, 25mg	L02BG06	AROMASIN, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1392780	eksemestaan, 25mg	L02BG06	ESCEPRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1392960	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						
1423134	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE ALVOGEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Alvogen Ipco S.a.r.l.	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1453632	eksemestaan, 25mg	L02BG06	EXEMESTANE SANOSWISS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UAB SanoSwiss	50						
					100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1533787	eksenatiid, 2mg	A10BJ01	BYDUREON, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti pen-süstlis, 4TK	AstraZeneca AB	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1725870	elbasviir+grasopreviir, 50mg+100mg	J05AP54	ZEPATIER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasuvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1462003	eltrombopaag, 25mg	B02BX05	REVOLADE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	100	D69.4-D69.4					patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl
1765784	emitsizumab, 150mg 1ml	B02BX06	HEMLIBRA, süstelahus, 0.4ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral
1765795	emitsizumab, 150mg 1ml	B02BX06	HEMLIBRA, süstelahus, 0.7ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral
1765807	emitsizumab, 150mg 1ml	B02BX06	HEMLIBRA, süstelahus, 1ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1649000	empagliflosiin, 10mg	A10BK03	JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1649134	empagliflosiin, 25mg	A10BK03	JARDIANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1010620	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAHEXAL 10 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1013599	enalapriil, 10mg	C09AA02	BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133929	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1359974	enalapriil, 10mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1010631	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1013601	enalapriil, 20mg	C09AA02	BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1087512	enalapriil, 20mg	C09AA02	EDNYT, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1133952	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1360033	enalapriil, 20mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074080	enalapriil, 5mg	C09AA02	BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1133895	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENAP, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1359918	enalapriil, 5mg	C09AA02	ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1147564	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1147575	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1147597	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg	C09BA02	ENAP-H, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1147609	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg	C09BA02	ENAP-H, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074888	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	CO-RENITEC, tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1129159	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	ENAHEXAL COMP 20 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1151389	enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA02	ENAP-HL, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619175	ensalutamiid, 40mg	L02BB04	XTANDI, pehmekapsel, 112TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda ravi abiraterooniga. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi ensalutamiidi sisaldava ravimpreparaadiga on välja kirjutatud enne 01.01.2020. a.
1247509	entekaviir, 0,5mg	J05AF10	BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	B18.0-B18.1	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1247510	entekaviir, 1mg	J05AF10	BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	100	B18.0-B18.1	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1588844	epinefriin (adrenaliin), 150mcg 0.3ml	C01CA24	EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK	SIA Meda Pharma	100	T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0					
1588866	epinefriin (adrenaliin), 300mcg 0.3ml	C01CA24	EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK	SIA Meda Pharma	100	T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0					
7017645	eritoitesegu,		Neocate Syneo, pulber, 400g N4	Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7017656	eritoitesegu,		COMIDA PKU C Formula Orange, pulber, 500g N1	UAB Pharm House	100	E70.0-E70.1					
					50						
7004911	eritoitesegu,		Lipistart , suukaudse lahuse pulber, 400 g	Vitaflo	100	E71.3-E71.3					ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral
7004955	eritoitesegu,		MONOGEN, pulber, 400g	Nutricia Ltd	100	E71.3-E71.3					ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beeta-oksüdatsiooni defektide korral
7017667	eritoitesegu,		COMIDA PKU C Formula, pulber, 500g N1	UAB Pharm House	50						
					100	E70.0-E70.1					
1767539	ertugliflosiin, 15mg	A10BK04	STEGLATRO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1767483	ertugliflosiin, 5mg	A10BK04	STEGLATRO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1422335	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZOLETA, tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1681174	esetimiib, 10mg	C10AX09	EZETIMIBE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I11-I12					raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					100	N18-N18					alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
1087949	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	AstraZeneca AB	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1087950	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	AstraZeneca AB	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1337891	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1337914	esomeprasool, 20mg	A02BC05	NEXMEZOL 20 MG, gastroresistentne tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1395985	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1396009	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1396032	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1542338	esomeprasool, 20mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1087972	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK	AstraZeneca AB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1087983	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1337981	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1338005	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1338027	esomeprasool, 40mg	A02BC05	NEXMEZOL 40 MG, gastroresistentne tablett, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396098	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1396111	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESCADRA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1542462	esomeprasool, 40mg	A02BC05	ESOMEPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1325023	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1331648	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1336676	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1336687	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva, k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1400218	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ELICEA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1484018	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	CIRASET 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1488540	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1543137	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ESTAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1559987	estsitalopraam, 10mg	N06AB10	ELICEA Q-TAB 10MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1325225	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1331907	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1400320	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ELICEA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1488595	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1560046	estsitalopraam, 20mg	N06AB10	ELICEA Q-TAB 20MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011665	etanertsept, 25mg	L04AB01	ENBREL, süstelahuse pulber ja lahusti, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265600	etanertsept, 25mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748482	etanertsept, 25mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI >=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265644	etanertsept, 50mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1460191	etanertsept, 50mg	L04AB01	ENBREL, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1708680	etanertsept, 50mg	L04AB01	BENEPALI, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Samsung Bioepis NL B.V.	100	M08-M08	Pediaater, Reumatoloog				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI>=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748527	etanertsept, 50mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	M07.0-M07.3	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Pediaater, Reumatoloog				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI >=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748561	etanertsept, 50mg	L04AB01	ERELZI, süstelahus pen-süstlis, 4TK	Sandoz GmbH	100	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud ja senised ravimeetodid on olnud ebaefektiivsed või talumatud ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas). PASI skoor või BSA skoor >=10 ja DLQI >=10

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M08-M08	Reumatoloog, Pediaater				suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M07.0-M07.3	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M05-M05, M08-M08, M06-M06	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt 2 kuud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	M45-M45, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater				vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ekstraartikulaarne haaratus
1589171	etonogestreel, 68mg	G03AC08	NEXPLANON, implantaat, 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
1138621	etonogestreel+etünüül östradiool, 120mcg+15mcg 24h	G02BB01	NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
1712584	etonogestreel+etünüül östradiool, 120mcg+15mcg 24h	G02BB01	SETLONA, vaginaalravivahend, 1TK	Mylan S.A.S	50						
1036213	etoposiid, 100mg	L01CB01	VEPESID, kapsel, 10TK	Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft.	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					50						
1085352	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1623260	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	COXITOR, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1653241	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 120 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Zentiva, k.s.	50						
1653252	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 120 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva, k.s.	50						
1658358	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Teva B.V.	50						
1658369	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1659809	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	OXIDRAXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1699577	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Krka d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1699588	etorikoksiib, 120mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1085318	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1622944	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	COXITOR, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1652824	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 60 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva, k.s.	50						
1658189	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1659540	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	OXIDRAXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1699342	etorikoksiib, 60mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1085330	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
1623103	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	COXITOR, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1653173	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 90 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Zentiva, k.s.	50						
1653184	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB ZENTIVA 90 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Zentiva, k.s.	50						
1658268	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Teva B.V.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658279	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
1659674	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	OXIDRAXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1699454	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1699465	etorikoksiib, 90mg	M01AH05	ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1433315	everoliimus, 10mg	L01XE10	AFINITOR, tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739842	everoliimus, 10mg	L01XE10	EVEROLIMUS KRKA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1787632	everoliimus, 10mg	L01XE10	EVEROLIMUS NORAMEDA, tablett, 30TK	UAB Norameda	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1433281	everoliimus, 5mg	L01XE10	AFINITOR, tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739819	everoliimus, 5mg	L01XE10	EVEROLIMUS KRKA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks
1680410	faktor VIII inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 25ühik 1ml	B02BD03	FEIBA 25 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 20ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.4-D68.4, D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1680421	faktor VIII inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 50ühik 1ml	B02BD03	FEIBA 50 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 20ml 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.4-D68.4, D66-D66	Hematoloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349300	febuksostaat, 120mg	M04AA03	ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1716207	febuksostaat, 120mg	M04AA03	FEBUXOSTAT TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1721753	febuksostaat, 120mg	M04AA03	DRUNILER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1748325	febuksostaat, 120mg	M04AA03	FEBUXOSTAT MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan S.A.S	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1750755	febuksostaat, 120mg	M04AA03	FEBUXOSTAT ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1791581	febuksostaat, 120mg	M04AA03	FEBUXOSTAT KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1349287	febuksostaat, 80mg	M04AA03	ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1716140	febuksostaat, 80mg	M04AA03	FEBUXOSTAT TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1721696	febuksostaat, 80mg	M04AA03	DRUNILER, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1748291	febuksostaat, 80mg	M04AA03	FEBUXOSTAT MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan S.A.S	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1750698	febuksostaat, 80mg	M04AA03	FEBUXOSTAT ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
					50						
1791547	febuksostaat, 80mg	M04AA03	FEBUXOSTAT KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	M10-M10					juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)
1012330	felodipiin, 10mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1019708	felodipiin, 10mg	C08CA02	PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1174474	felodipiin, 10mg	C08CA02	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1012318	felodipiin, 2,5mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1012329	felodipiin, 5mg	C08CA02	PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1019696	felodipiin, 5mg	C08CA02	PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1174373	felodipiin, 5mg	C08CA02	FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1029495	fenobarbitaal, 100mg	N03AA02	PHENAEMAL, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1026593	fenofibraat, 200mg	C10AB05	LIPANTHYL, kõvakapsel, 30TK	Mylan Healthcare SIA	50						
1020340	fenoksümetüülpenitsillin, 1000000RÜ	J01CE02	OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Sandoz GmbH	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1106536	fenoksümetüülpenitsillin, 1000000RÜ	J01CE02	VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1105951	fenoksümetüülpenitsillin, 400000RÜ 5ml	J01CE02	OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK	Sandoz GmbH	75	H65-H67, J13-J18				16,00	
					50						
1044223	fenoterool, 100mcg 1annust	R03AC04	BEROTEC N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009651	fenoterool+ipratroopiumbromiid, 50mcg+20mcg 1annust	R03AL01	BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346958	fentanüül, 100mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Reumatoloog, Neuroloog, Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400948	fentanüül, 100mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	100	C00-D48	Neuroloog, Reumatoloog, Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223165	fentanüül, 100mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223121	fentanüül, 12mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346970	fentanüül, 200mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400959	fentanüül, 200mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Reumatoloog, Onkoloog, Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1514034	fentanüül, 200mcg	N02AB03	BREAKYL, bukaalravimkile, 10TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50						
					100	C00-D48	Neuroloog, Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223132	fentanüül, 25mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400960	fentanüül, 300mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Reumatoloog, Onkoloog, Hematoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346992	fentanüül, 400mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Onkoloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Hematoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400971	fentanüül, 400mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1586796	fentanüül, 400mcg	N02AB03	BREAKYL, bukaalravimkile, 10TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223143	fentanüül, 50mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347038	fentanüül, 600mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	100	C00-D48	Onkoloog, Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400982	fentanüül, 600mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog, Hematoloog, Onkoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1223154	fentanüül, 75mcg 1h	N02AB03	MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347016	fentanüül, 800mcg	N02AB03	EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	C00-D48	Anestesioloog, Onkoloog, Reumatoloog, Neuroloog, Hematoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400993	fentanüül, 800mcg	N02AB03	LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Anestesioloog, Reumatoloog, Hematoloog, Neuroloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu
1077050	fenütoiin, 100mg	N03AB02	PHENHYDAN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1300587	finasteriid, 5mg	G04CB01	FINASTERIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1338724	finasteriid, 5mg	G04CB01	FINASTERIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1070637	flekainiid, 100mg	C01BC04	TAMBOCOR, tablett, 100TK	Teva B.V.	50						
1756942	flekainiid, 100mg	C01BC04	TAMBOCOR, tablett, 60TK	Teva B.V.	50						
1140275	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOL NYCOMED 150MG, kõvakapsel, 1TK	Takeda Pharma AS	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1140286	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOL TAKEDA 150MG, kõvakapsel, 2TK	Takeda Pharma AS	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140703	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 1TK	Medochemie Limited	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1144842	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUNOC, kõvakapsel, 2TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1395165	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 1TK	SIA ELVIM	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1395176	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 2TK	SIA ELVIM	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1395187	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 4TK	SIA ELVIM	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1490688	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 1TK	Actavis Group PTC ehf	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1490699	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ACTAVIS, kõvakapsel, 2TK	Actavis Group PTC ehf	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1531279	flukonasool, 150mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 2TK	Medochemie Limited	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1140691	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE, kõvakapsel, 7TK	Medochemie Limited	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1395660	flukonasool, 50mg	J02AC01	FLUCONAZOLE ELVIM, kõvakapsel, 7TK	SIA ELVIM	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1167971	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+20mg 1g	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/20MG/G REKTAALKREEM, rektaalkreem, 15g 1TK	Karo Pharma Aktiebolag	50						
1167948	fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg	C05AA84	DOLOPROCT 1MG/40MG REKTAALSUPOSIIDID, rektaalsuposiit, 10TK	Karo Pharma Aktiebolag	50						
1107122	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUX, kõvakapsel, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1456691	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1456703	fluoksetiin, 20mg	N06AB03	FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	VITABALANS OY	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1489765	flupentiksool, 1mg	N05AF01	FLUANXOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006175	flupentiksool, 20mg 1ml	N05AF01	FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1007840	flutikasoon, 100mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1007884	flutikasoon, 250mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
1006344	flutikasoon, 500mcg 1g	D07AC17	CUTIVATE CREAM, kreem, 15g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
1007233	flutikasoon, 50mcg 1annust	R01AD08	FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1007862	flutikasoon, 50mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1130690	flutikasoon, 50mcg 1annust	R03BA05	FLIXOTIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
1343034	flutikasoonfuroaat, 27,5mcg 1annust	R01AD12	AVAMYS, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011126	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	SIA Novartis Baltics	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1287187	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	FLUVASTATIN ACTAVIS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1723216	fluvastatiin, 80mg	C10AA04	LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	First Pharma OÜ	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1039564	fluvoksamiin, 100mg	N06AB08	FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Mylan Healthcare SIA	50						
1087152	formoterool, 12mcg	R03AC13	FORADIL AEROLIZER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK	SIA Novartis Baltics	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
					50						
1178939	formoterool, 12mcg 1annust	R03AC13	FOMEDA EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1034075	formoterool, 9mcg 1annust	R03AC13	OXIS TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1669697	formoterool+aklidiinium, 11,8mcg+340mcg 1annust	R03AL05	BRIMICA GENUAIR, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1314256	formoterool+beklometasoon, 6mcg+100mcg 1annust	R03AK08	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annust 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1796991	formoterool+beklometasoon, 6mcg+100mcg 1annust	R03AK08	FOSTER NEXTHALER, inhalatsioonipulber, 180annust 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	50						
					75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1653410	formoterool+beklometasoon, 6mcg+200mcg 1annust	R03AK08	FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annust 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742778	formoterool+budesoniid, 4,5mcg+160mcg 1annuses	R03AK07	AIRBUFO FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1742789	formoterool+budesoniid, 4,5mcg+160mcg 1annuses	R03AK07	AIRBUFO FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 2TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1068443	formoterool+budesoniid, 4,5mcg+160mcg 1annust	R03AK07	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1611470	formoterool+budesoniid, 4,5mcg+160mcg 1annust	R03AK07	BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK	Orion Corporation	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1156250	formoterool+budesoniid, 9mcg+320mcg 1annust	R03AK07	SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	AstraZeneca AB	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1611481	formoterool+budesoniid, 9mcg+320mcg 1annust	R03AK07	BUFOMIX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1786596	formoterool+glükopürroonium, 5mcg+7,2mcg 1annuses	R03AL07	BEVESPI AEROSPHERE, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	AstraZeneca AB	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1750227	formoterool+glükopürroonium+beklometasoon, 5mcg+9mcg+87mcg 1annust	R03AL09	TRIMBOW, inhalatsiooniaerosool, lahus, 120annust 1TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1027145	fosinopriil, 10mg	C09AA09	MONOPRIL, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1193767	fosinopriil, 10mg	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1027336	fosinopriil, 20mg	C09AA09	MONOPRIL, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1193891	fosinopriil, 20mg	C09AA09	FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1107021	fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA09	MONOZIDE, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1250581	fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg	C09BA09	FOSINOPRIL HCT ACTAVIS, tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1161548	frovatriptaan, 2,5mg	N02CC07	MIGARD, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1060399	furosemiid, 40mg	C03CA01	FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
1039362	furosemiid, 60mg	C03CA01	LASIX RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	100	I27.0-I27.0					
					75	I50-I50					
					50						
1018606	fusidiinhape, 10mg 1g	S01AA13	FUCITHALMIC, silmatilgad, suspensioon, 5g 1TK	Amdipharm Limited	50						
1007727	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX01	FUCIDIN 20 mg/g salv, salv, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1007750	fusidiinhape, 20mg 1g	D06AX01	FUCIDIN 20 mg/g kreem, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1032815	gabapentiin, 300mg	N03AX12	NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1126055	gabapentiin, 300mg	N03AX12	GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 50TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1696417	gabapentiin, 300mg	N03AX12	GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1125953	gabapentiin, 400mg	N03AX12	GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1696529	gabapentiin, 400mg	N03AX12	GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1035098	gestodeen+etünüülöstradiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA10	LOGEST, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1115716	gestodeen+etünüülöstradiool, 0,075mg+0,02mg	G03AA10	LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1023624	gestodeen+etünüülöstradiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA10	FEMODEN, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1115693	gestodeen+etünüülöstradiool, 0,075mg+0,03mg	G03AA10	LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1510030	gestodeen+etünüülöstradiool, 60mcg+15mcg	G03AA10	VONILLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Exeltis Baltics, UAB	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1062953	gestodeen+etünüülöstradiool, 75mcg+20mcg	G03AA10	HARMONET, kaetud tablett, 63TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1364105	gestodeen+etünüülöstradiool, 75mcg+20mcg	G03AA10	GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	ratiopharm GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1364138	gestodeen+etünüülöstradiool, 75mcg+30mcg	G03AA10	GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK	ratiopharm GmbH	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1061334	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	LANTUS, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1265790	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	LANTUS SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1665053	glargiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AE04	ABASAGLAR KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1684043	glargiin-insuliin, 300ühik 1ml	A10AE04	TOUJEO, süstelahus pen-süstlis, 1.5ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1737042	glargiin-insuliin+liksisenatiid, 100ühik+33mcg 1ml	A10AE54	SULIQUA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	sanofi-aventis groupe	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1737020	glargiin-insuliin+liksisenatiid, 100ühik+50mcg 1ml	A10AE54	SULIQUA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	sanofi-aventis groupe	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1241244	glatirameeratsetaat, 20mg 1ml	L03AX13	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 28TK	TEVA GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks
1618196	glatirameeratsetaat, 40mg 1ml	L03AX13	COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 12TK	TEVA GmbH	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1751037	glekapreviir+pibrentasviir, 100mg+40mg	J05AP57	MAVIRET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				sõltumata genotüübist, kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasuvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4)
1261066	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1261101	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1603145	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLAZIDE KRKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1643778	gliklasiid, 30mg	A10BB09	GLICLAZIDE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1350054	gliklasiid, 60mg	A10BB09	DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1551822	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1551855	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLADA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1551945	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE KRKA 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1644601	gliklasiid, 60mg	A10BB09	GLICLAZIDE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1046405	gliklasiid, 80mg	A10BB09	DIAPREL, tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1084957	glimepiriid, 1mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1176948	glimepiriid, 1mg	A10BB12	OLTAR 1MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1334821	glimepiriid, 1mg	A10BB12	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1110328	glimepiriid, 2mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1177039	glimepiriid, 2mg	A10BB12	OLTAR 2 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1191709	glimepiriid, 2mg	A10BB12	MEGLIMID, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1334865	glimepiriid, 2mg	A10BB12	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1671195	glimepiriid, 2mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1110339	glimepiriid, 3mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1177129	glimepiriid, 3mg	A10BB12	OLTAR 3 MG, tablett, 30TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1191787	glimepiriid, 3mg	A10BB12	MEGLIMID, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1334900	glimepiriid, 3mg	A10BB12	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1670992	glimepiriid, 3mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1125391	glimepiriid, 4mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1191844	glimepiriid, 4mg	A10BB12	MEGLIMID, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1334944	glimepiriid, 4mg	A10BB12	GLIMEPIRIDE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1395121	glimepiriid, 6mg	A10BB12	AMARYL, tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1029338	glipisiid, 10mg	A10BB07	GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1029349	glipisiid, 5mg	A10BB07	GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1201396	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1294398	glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml	A10AB06	APIDRA SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1165878	glükagoon, 1mg	H04AA01	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	50						
1326653	glükoosamiin, 1178mg	M01AX05	GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1178 MG, suukaudse lahuse pulber, 20TK	ratiopharm GmbH	50						
1183687	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 90TK	Pharma Nord ApS	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1183698	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 270TK	Pharma Nord ApS	50						
1220094	glükoosamiin, 400mg	M01AX05	GLUCADOL, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Takeda Pharma AS	50						
1595954	glükopürroonium, 44mcg 1annust	R03BB06	SEEBRI BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1648403	gosereliin, 10,8mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1002621	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	ZOLADEX, implantaat, 1TK	AstraZeneca AB	75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					50						
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1648425	gosereliin, 3,6mg	L02AE03	RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK	Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	75	N80-N80					III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel
					50						
1023950	granisetroon, 1mg	A04AA02	KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Atnahs Pharma Netherlands B.V.	50						
					100	C00-D48					suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014680	haloperidool, 1,5mg	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
					50						
1014691	haloperidool, 2mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
1064674	haloperidool, 50mg 1ml	N05AD01	HALOPERIDOL DECANOATE-RICHTER, süstelahus, 1ml 5TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1014679	haloperidool, 5mg	N05AD01	HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					100	F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7	Psühhiaater	esmane			
1054055	hõbesulfadiasiin, 10mg 1g	D06BA01	SULFARGIN, salv, 50g 1TK	AS Grindeks	50						
1015478	hüdroklorotiasiid, 25mg	C03AA03	HYPOTHIAZID, tablett, 20TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
1008841	hüdroklorotiasiid+amiloriid, 50mg+5mg	C03EA81	MODURETIC, tablett, 30TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	100	N25.1-N25.1					
1137013	hüdrokortisoon, 10mg 1g	D07AA02	HYDROCORTISONE DAK, salv, 30g 1TK	Takeda Pharma AS	50						
1018594	hüdrokortisoon+fusidiinhape, 10mg+20mg 1g	D07CA83	FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1035403	hüdrokortisoon+kloorheksidiin, 10mg+10mg 1g	D07BA80	SIBICORT, kreem, 20g 1TK	Orion Corporation	50						
1045145	hüdrokortisoon+tsiprofloksatsiin, 10mg+2mg 1ml	S02CA82	CIPROBAY HC, kõrvatilgad, suspensioon, 10ml 1TK	SIA Novartis Baltics	50						
1036022	hüdroksükarbamiid, 500mg	L01XX05	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	Bristol-Myers Squibb Kft.	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
1615698	hüdroksükarbamiid, 500mg	L01XX05	HYDREA, kõvakapsel, 100TK	First Pharma OÜ	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1027291	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
1529579	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	First Pharma OÜ	50						
					75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
1566086	hüdroksüklorokviin, 200mg	P01BA02	PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	First Pharma OÜ	75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					50						
1400858	ibandroonhape, 150mg	M05BA06	BAXOGAR, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK	Alvogen Ipco S.a.r.l.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1498978	ibandroonhape, 150mg	M05BA06	IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK	Teva B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1498989	ibandroonhape, 150mg	M05BA06	IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK	Teva B.V.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1668034	ibrutiniib, 140mg	L01XE27	IMBRUVICA, kõvakapsel, 90TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi ibrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.10.2019.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1798825	ibrutiniib, 140mg	L01XE27	IMBRUVICA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi ibrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2020.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1775156	ibrutiniib, 420mg	L01XE27	IMBRUVICA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi ibrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2020.
1073012	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1073089	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1473588	ibuprofeen, 400mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1032714	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1073113	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
1085194	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
1085206	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1473599	ibuprofeen, 600mg	M01AE01	IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1697126	idebenoon, 150mg	N06BX13	RAXONE, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH	100	H47.2-H47.2	Oftalmoloog				ravimi väljakirjutamise õigus geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel. Soodustus kehtib alates kliiniliselt olulise paranemise (clinically relevant recovery, CRR) saavutamisest võrreldes idebenoon-ravi alustamisega. Ravivastuse hindamine toimub iga 3 kuu järel kuni CRR saavutamiseni ning seejärel iga 6 kuu tagant. Ravi lõpetatakse, kui pärast CCR saavutamist ei ole kahel järjestikusel mõõtmisel enam toimunud täiendavat nägemisteravuse paranemist. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil).
1291890	iloprost, 10mcg 1ml	B01AC11	VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 30TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1291902	iloprost, 10mcg 1ml	B01AC11	VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 168TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1548592	imatiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB ZENTIVA 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva, k.s.	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1566413	imatiniib, 100mg	L01XE01	MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Krka d.d. Novo mesto	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588417	imatiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB GRINDEKS, kõvakapsel, 120TK	AS Grindeks	100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1604900	imatiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva B.V.	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619726	imatiniib, 100mg	L01XE01	IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658448	imatiniib, 100mg	L01XE01	GLIPOX, kõvakapsel, 120TK	UAB Norameda	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1619759	imatiniib, 400mg	L01XE01	IMATINIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1658471	imatiniib, 400mg	L01XE01	GLIPOX, kõvakapsel, 30TK	UAB Norameda	100	C83.5-C83.5, C91.0-C91.0	Hematoloog				patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C49.9-C49.9, C16-C20	Onkoloog				patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
					100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7000063	imikute toitesegu,		Neocate (aminohapete segu) , pulber, 400 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7000074	imikute toitesegu,		APTAMIL Pepti (APTAMIL ALLERGY CARE) , pulber, 450 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7000085	imikute toitesegu,		APTAMIL Pepti MCT (APTAMIL DIGESTIVE CARE), pulber, 450 g	N.V. Nutricia	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7002313	imikute toitesegu,		MILUPA APTAMIL FMS, pulber, 200 g	N.V. Nutricia	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7002863	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PEP AC, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7002874	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PREMATURE, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7002885	imikute toitesegu,		FRISOLAC GOLD PEP, pulber, 400g	Friesland Foods BV	75	K52.2-K52.2, L20.8-L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2				1,00	
7004933	imikute toitesegu,		APTAMIL PREMATIL, pulber, 400 g	Nutricia Cuijk BV.	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
7017432	imikute toitesegu,		INFATRINI, suspensioon, 125ml N24	Nutricia	75	E42-E42				1,00	lastele, kellele on paigaldatud gastrostoom või jejunostoom
7017948	imikute toitesegu,		Aptamil HMF , pulber, 2,2g N50	Nutricia Cuijk bv	75	P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1				0,58	
1060322	imikvimood, 5%	D06BB10	ALDARA, kreem, 250mg 12TK	Meda AB	50						
1452169	indakaterool, 150mcg	R03AC18	ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1452215	indakaterool, 300mcg	R03AC18	ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1626555	indakaterool+glükopürroonium, 85mcg+43mcg 1annust	R03AL04	ULTIBRO BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1167780	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
1185230	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	RAWEL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
1379741	indapamiid, 1,5mg	C03BA11	INDAMAX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1019416	indapamiid, 2,5mg	C03BA11	TERTENSIF, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
1038383	indapamiid, 2,5mg	C03BA11	PROINDAP, kõvakapsel, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	75	I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1071841	indometatsiin, 50mg	M01AB01	INDOMET- RATIOPHARM 50MG, kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	75	M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1105940	ipratroopiumbromiid, 20mcg 1annust	R03BB01	ATROVENT N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1699724	isavukonasool, 100mg	J02AC05	CRESEMBA, kõvakapsel, 14TK	Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH	100	B46-B46					kui ravi on alustatud haiglas
					100	B44-B44					kui ravi vorikonasooliga on olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud ning ravi on alustatud haiglas
1000348	isokonasool, 10mg 1g	D01AC05	TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1000416	isokonasool+diflukortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1783830	isokonasool+diflukortoloon, 10mg+1mg 1g	D01AC80	TRAVOCORT, kreem, 30g 1TK	First Pharma OÜ	50						
1015074	isosorbiitdinitraat, 20mg	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I20-I20					
					50						
1008964	isosorbiitdinitraat, 40mg	C01DA08	ISDN-RATIOPHARM 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I20-I20					
					50						
1146361	isosorbiitmononitraat, 20mg	C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					75	I20-I20					
1146372	isosorbiitmononitraat, 20mg	C01DA14	ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS, tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
					75	I20-I20					
1101913	isosorbiitmononitraat, 40mg	C01DA14	OLICARD 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					75	I20-I20					
1046786	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	IMDUR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	TopRidge Pharma (Ireland) Limited	75	I20-I20					
					50						
1101924	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	OLICARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Mylan Healthcare SIA	75	I20-I20					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1127584	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Hexal AG	75	I20-I20					
					50						
1252741	isosorbiitmononitraat, 60mg	C01DA14	ISOMONIT 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Hexal AG	50						
					75	I20-I20					
1004364	isotretinoiin, 10mg	D10BA01	ROACCUTANE 10 MG, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	50						
					75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
1112230	isotretinoiin, 20mg	D10BA01	ROACCUTANE 20 MG, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	75	L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2	Dermatoveneroloog				
					50						
1164035	itrakonasool, 100mg	J02AC02	PROKANAZOL, kõvakapsel, 4TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
1164057	itrakonasool, 100mg	J02AC02	PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1183553	itrakonasool, 100mg	J02AC02	CLADOSOL 100MG, kõvakapsel, 14TK	Stada Arzneimittel AG	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1230488	itrakonasool, 100mg	J02AC02	ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks
					50						
1219553	ivabradiin, 5mg	C01EB17	PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Les Laboratoires Servier	50						
1700413	ivabradiin, 5mg	C01EB17	BIXEBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1700772	ivabradiin, 5mg	C01EB17	IVABRADINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AS Grindeks	50						
1715712	ivabradiin, 5mg	C01EB17	IVABRADINE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Mylan S.A.S	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1746378	ivabradiin, 5mg	C01EB17	IVABRADINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1219485	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Les Laboratoires Servier	50						
1700514	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	BIXEBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					50						
					50						
					50						
1700783	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	IVABRADINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AS Grindeks	50						
1715891	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	IVABRADINE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Mylan S.A.S	50						
1746446	ivabradiin, 7,5mg	C01EB17	IVABRADINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1038068	IX hüübimisfaktor, 1200RÜ	B02BD04	IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D67-D67	Pediaater, Hematoloog				
1038057	IX hüübimisfaktor, 600RÜ	B02BD04	IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D67-D67	Hematoloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1728840	kabosantiniib, 20mg	L01XE26	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine kabosantiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning kellel mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1728862	kabosantiniib, 40mg	L01XE26	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine kabosantiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning kellel mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1728884	kabosantiniib, 60mg	L01XE26	CABOMETYX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Ipsen Pharma	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine kabosantiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning kellel mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1093340	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	DAIVOBET, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L40-L40					
					50						
1534621	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	DAIVOBET, geel, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L40-L40					
					50						
1676369	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	CABEMET, salv, 30g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	L40-L40					
1676370	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	CABEMET, salv, 60g 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	L40-L40					
1680050	kaltsipotriool+beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g	D05AX80	ENSTILAR, nahavaht, 60g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L40-L40					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004599	kaltsitriool, 0,25mcg	A11CC04	ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK	Roche Eesti OÜ	100	E89.2-E89.2, E20-E20	Pediaater, Endokrinoloog				
					100	N25-N25, N18-N18	Nefroloog, Pediaater				
					50						
1392016	kaltsium+kolekaltsiferol, 500mg+400RÜ	A12AX80	CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 120TK	Takeda Pharma AS	100	N18-N18					
					75	M80-M80					kombinatsioonravi osana patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1046337	kaltsiumkarbonaat, 1250mg	A12AA04	CALCIGRAN SINE, närimistablett, 100TK	Takeda Pharma AS	100	E89.2-E89.2, E20-E20	Pediaater, Endokrinoloog				
					100	N18-N18					
1776483	kaltsiumkarbonaat, 1250mg	A12AA04	CALCIGRAN SINE, närimistablett, 120TK	Takeda Pharma AS	100	E89.2-E89.2, E20-E20	Endokrinoloog, Pediaater				
					100	N18-N18					
1129519	kaltsiumnadropariin, 2850RÜ anti Xa 0.3ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.3ml 10TK	Aspen Pharma Trading Limited	75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					50						
					100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065664	kaltsiumnadropariin, 3800RÜ anti Xa 0.4ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1124110	kaltsiumnadropariin, 5700RÜ anti Xa 0.6ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.6ml 10TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					100	O99.8-O99.8					
					50						
1129496	kaltsiumnadropariin, 7600RÜ anti Xa 0.8ml	B01AB06	FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.8ml 10TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					50						
					100	O99.8-O99.8					
1291058	kandesartaan, 16mg	C09CA06	PRESCANDEN 16MG, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1455061	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CANDESARTAN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1475962	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CANTAR, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1487572	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CARZAN 16MG, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1497630	kandesartaan, 16mg	C09CA06	CANOCORD 16 MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1183867	kandesartaan, 32mg	C09CA06	ATACAND, tablett, 28TK	AstraZeneca AB	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1396458	kandesartaan, 32mg	C09CA06	PRESCANDEN 32MG, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1455140	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CANDESARTAN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1476110	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CANTAR, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1487651	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CARZAN 32MG, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1497719	kandesartaan, 32mg	C09CA06	CANOCORD 32 MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1497551	kandesartaan, 8mg	C09CA06	CANOCORD 8 MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1589665	kandesartaan+amlodipiin, 16mg+10mg	C09DB07	ZENICAMO, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1355879	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	PRESCANDEN HCT 16 MG/12,5 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1455375	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	CANDESARTAN HCT ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1487819	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	CARZAN HCT 16MG/12,5MG, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1501063	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1634419	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 16mg+12,5mg	C09DA06	CANOCOMBI, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1634600	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 32mg+12,5mg	C09DA06	CANOCOMBI, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1634329	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 32mg+25mg	C09DA06	CANOCOMBI, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1634510	kandesartaan+hüdroklorotiasiid, 8mg+12,5mg	C09DA06	CANOCOMBI, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1567986	kapetsitabiin, 150mg	L01BC06	CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					50						
					100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
1540099	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE ZENTIVA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Zentiva, k.s.	100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1544004	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					50						
1568055	kapetsitabiin, 500mg	L01BC06	CAPECITABINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C18-C20	Onkoloog				kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks
					100	C22-C25	Onkoloog				biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks
					50						
1077117	karbamasepiin, 150mg	N03AF01	TIMONIL 150 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008649	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	CARBAMAZEPINE NYCOMED, tablett, 50TK	Takeda Pharma AS	75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1035942	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1036055	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	FINLEPSIN, tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1042311	karbamasepiin, 200mg	N03AF01	CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1077207	karbamasepiin, 300mg	N03AF01	TIMONIL 300 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1115592	karbamasepiin, 300mg	N03AF01	CARBALEX RETARD 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F18.4-F18.7, F33.2-F33.3, F70-F79, F00-F09, F15.4-F15.7, F14.4-F14.7, F12.4-F12.7, F30-F31, F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F10.4-F10.7, F16.4-F16.7, F32.2-F32.3, F13.4-F13.7, F20-F29, F19.4-F19.7	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1035953	karbamasepiin, 400mg	N03AF01	FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1042322	karbamasepiin, 400mg	N03AF01	CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007716	karbamasepiin, 600mg	N03AF01	TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G50.0-G50.0					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1042333	karbamasepiin, 600mg	N03AF01	CARBALEX RETARD 600 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	G.L. Pharma GmbH	75	G50.0-G50.0					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1110564	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1157543	karvedilool, 12,5mg	C07AG02	CORYOL 12,5 MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I50-I50, I47-I49					
1110520	karvedilool, 25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I50-I50, I47-I49					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1157644	karvedilool, 25mg	C07AG02	CORYOL 25 MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
1110609	karvedilool, 6,25mg	C07AG02	CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I50-I50, I47-I49					
					50						
1115637	keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100TÜ 1ml	A10AC01	HUMULIN N KWIKPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1018189	ketokonasool, 20mg 1g	D01AC08	NIZORAL, kreem, 15g 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1073461	ketoprofeen, 100mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1073483	ketoprofeen, 100mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1073506	ketoprofeen, 50mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	75	M15-M19			63,00		
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
1073517	ketoprofeen, 50mg	M01AE03	KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1486559	klaritromütsiin, 125mg 5ml	J01FA09	LEKOKLAR, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1028887	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
1032747	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
1110261	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
1549582	klaritromütsiin, 250mg	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AS Grindeks	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
					50						
1068881	klaritromütsiin, 25mg 1ml	J01FA09	KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	Mylan Healthcare SIA	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
					50						
1028876	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
1032758	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK	Mylan Healthcare SIA	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1068904	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
1110238	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
					50						
1141276	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK	Krka d.d. Novo mesto	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
					50						
1141287	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
1166677	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.	50						
1188086	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	LEKOKLAR XL 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1405460	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	KLACID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Mylan Healthcare SIA	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
					50						
1549627	klaritromütsiin, 500mg	J01FA09	CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AS Grindeks	75	H65-H67, J13-J18				16,00	kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011160	klindamütsiin, 100mg	G01AA10	DALACIN, vaginaalsuposiit, 3TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1021914	klindamütsiin, 10mg 1ml	D10AF01	DALACIN T, nahalahus, 30ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1007503	klindamütsiin, 150mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1007536	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	DALACIN C, kõvakapsel, 16TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1108561	klindamütsiin, 300mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 300, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK	MIP Pharma GmbH	50						
1108606	klindamütsiin, 600mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK	MIP Pharma GmbH	50						
1432268	klindamütsiin, 600mg	J01FF01	CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 32TK	MIP Pharma GmbH	50						
1527814	klindamütsiin+tretinoiin, 10mg+0,25mg 1g	D10AF82	TRECLINAC, geel, 30g 1TK	SIA Meda Pharma	50						
1005208	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD01	DERMOVATE OINTMENT, salv, 25g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1005242	klobetasool, 500mcg 1g	D07AD01	DERMOVATE CREAM, kreem, 25g 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1005286	klobetasool, 500mcg 1ml	D07AD01	DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1011407	klomipramiin, 10mg	N06AA04	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	SIA Novartis Baltics	50						
1001462	klomipramiin, 25mg	N06AA04	ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK	SIA Novartis Baltics	50						
1011418	klomipramiin, 75mg	N06AA04	ANAFRANIL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	SIA Novartis Baltics	50						
1004544	klonasepaam, 2mg	N03AE01	RIVOTRIL, tablett, 30TK	Roche Eesti OÜ	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50	G20-G26, G63-G63					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007345	kloorambutsiil, 2mg	L01AA02	LEUKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					50						
1044357	klooramfenikool, 5mg 1ml	S01AA01	OFTAN AKVAKOL, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	Santen Oy	50						
1356937	kloormadinoon+etünüü löstradiool, 2mg+0,03mg	G03AA15	CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	UAB Exeltis Baltics	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1356948	kloormadinoon+etünüü löstradiool, 2mg+0,03mg	G03AA15	CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	UAB Exeltis Baltics	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1006063	kloorprotikseen, 25mg	N05AF03	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006096	kloorprotikseen, 50mg	N05AF03	TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1040588	klopidogreel, 75mg	B01AC04	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	sanofi-aventis groupe	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
1065743	klopidogreel, 75mg	B01AC04	PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	sanofi-aventis groupe	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
1357141	klopidogreel, 75mg	B01AC04	TROMBEX 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1367197	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL SANOSWISS 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB SanoSwiss	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
1369874	klopidogreel, 75mg	B01AC04	GLOPENEL 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Auxilia Pharma OÜ	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1369908	klopidogreel, 75mg	B01AC04	GLOPENEL 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Auxilia Pharma OÜ	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						
1371484	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1371530	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						
1431256	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						
1437465	klopidogreel, 75mg	B01AC04	ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						
1437500	klopidogreel, 75mg	B01AC04	ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Sisearst, Kardioloog	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1448489	klopidogreel, 75mg	B01AC04	CLOPIDOGREL KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Krka d.d. Novo mesto	75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
					50						
1004724	klosapiin, 100mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
1663859	klosapiin, 100mg	N05AH02	CLOZAPINE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004768	klosapiin, 25mg	N05AH02	LEPONEX, tablett, 50TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
1663657	klosapiin, 25mg	N05AH02	CLOZAPINE ACCORD, tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31					
					50						
1033692	klotrimasool, 1%/100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, kreem + vaginaalsuposiit, 20g 1TK / 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1033726	klotrimasool, 100mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1045123	klotrimasool, 100mg	G01AF02	KLOTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	50						
1033737	klotrimasool, 200mg	G01AF02	CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 3TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1140815	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140826	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1485187	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	ALGOCALM, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
1485200	kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg	N02AJ06	ALGOCALM, tablett, 100TK	Zentiva, k.s.	50						
1241356	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1258297	kvetiapiin, 100mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1636792	kvetiapiin, 150mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1683750	kvetiapiin, 150mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1115086	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca AB	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1241378	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1258477	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1301847	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1454059	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1636859	kvetiapiin, 200mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1241334	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1258208	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1258242	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1377503	kvetiapiin, 25mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1301937	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1454149	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1496998	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1636916	kvetiapiin, 300mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1454206	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1497067	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1724510	kvetiapiin, 400mg	N05AH04	KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1555253	kvetiapiin, 50mg	N05AH04	QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007828	labetalool, 100mg	C07AG01	TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					75	O10-O16					
1043042	lamivudiin, 100mg	J05AF05	ZEFFIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1025873	lamivudiin, 150mg	J05AF05	EPIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	ViiV Healthcare BV	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1379123	lamotrigiin, 100mg	N03AX09	LAMICTAL 100MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1394210	lamotrigiin, 25mg	N03AX09	LAMICTAL 25MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1379088	lamotrigiin, 50mg	N03AX09	LAMICTAL 50MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					100	F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1141434	lamotrigiin, 5mg	N03AX09	LAMICTAL 5MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1394018	lamotrigiin, 5mg	N03AX09	LAMICTAL 5MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1134560	lanreotiid, 120mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 120MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Onkoloog, Endokrinoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1134582	lanreotiid, 60mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 60MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Endokrinoloog, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1134571	lanreotiid, 90mg	H01CB03	SOMATULINE AUTOGEL 90MG, süstelahus süstlis, 1TK	Ipsen Pharma	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Endokrinoloog, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks
1235056	lantaan, 750mg	V03AE03	FOSRENOL, närimistablett, 90TK	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
1041196	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Upjohn EESV	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1165733	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	GLAUMAX, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Kevelt AS	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1346790	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST ACTAVIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Actavis Group PTC ehf	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1346802	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATANOPROST ACTAVIS, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	Actavis Group PTC ehf	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1377873	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	UNILAT, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	UNIMED PHARMA spol. s.r.o	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1385771	latanoprost, 50mcg 1ml	S01EE01	LATIZOLIL, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1073001	latsidipiin, 4mg	C08CA09	LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1073023	latsidipiin, 4mg	C08CA09	LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1122567	latsidipiin, 6mg	C08CA09	LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	GlaxoSmithKline SpA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1122578	latsidipiin, 6mg	C08CA09	LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	GlaxoSmithKline SpA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1009921	leflunomiid, 10mg	L04AA13	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	75	M07-M07	Pediaater, Reumatoloog				kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1009932	leflunomiid, 20mg	L04AA13	ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	75	M07-M07	Reumatoloog, Pediaater				kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				kui mono- ja kombinatsioonravi metotreksaadi ja sulfasalasiiniga pole küllaldaselt efektiivne, on vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299551	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	REVLIMID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti kolme hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1747762	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE TEVA, kõvakapsel, 21TK	Teva B.V.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748156	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766000	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	AS Grindeks	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780411	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1806072	lenalidomiid, 10mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ZENTIVA, kõvakapsel, 21TK	Zentiva, k.s.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299562	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	REVLIMID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1747784	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE TEVA, kõvakapsel, 21TK	Teva B.V.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748202	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766022	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	AS Grindeks	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780433	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1806094	lenalidomiid, 15mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ZENTIVA, kõvakapsel, 21TK	Zentiva, k.s.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299573	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	REVLIMID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1747807	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE TEVA, kõvakapsel, 21TK	Teva B.V.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748257	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766066	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	AS Grindeks	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780455	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1806139	lenalidomiid, 25mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ZENTIVA, kõvakapsel, 21TK	Zentiva, k.s.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1299540	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	REVLIMID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	D46-D46	Hematoloog				konsiiliumi (vähemasti kolme hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1747740	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE TEVA, kõvakapsel, 21TK	Teva B.V.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1748101	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE AUXILIA, kõvakapsel, 21TK	Auxilia Pharma OÜ	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1765964	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK	AS Grindeks	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780376	lenalidomiid, 5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1780398	lenalidomiid, 7,5mg	L04AX04	LENALIDOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 21TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	C90-C90	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks, ning siirdamise näidustuseta patsiendile kombinatsioonis steroidiga juhul, kui bortesomiib ja talidomiid on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1687192	lenvatiniib, 10mg	L01XE29	LENVIMA, kõvakapsel, 30TK	Eisai GmbH	100	C73-C73	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on >=22,2 GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1687181	lenvatiniib, 4mg	L01XE29	LENVIMA, kõvakapsel, 30TK	Eisai GmbH	100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud või opereerimatu hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C73-C73	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on >=22,2 GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1474950	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1611234	lerkanidipiin, 10mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1474994	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1611245	lerkanidipiin, 20mg	C08CA13	LERCANIDIPINE ACTAVIS 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1034334	letrosool, 2,5mg	L02BG04	FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	SIA Novartis Baltics	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1302398	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UAB SanoSwiss	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Onkoloog, Günekoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1349771	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C50-C50	Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1409352	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LETROZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C50-C50	Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
1554702	letrosool, 2,5mg	L02BG04	LORTANDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	C50-C50	Günekoloog, Onkoloog, Üldkirurg				günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1198975	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma SA	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1544981	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1545566	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1546130	levetiratsetaam, 1000mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
1198762	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma SA	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1544802	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1545353	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1545904	levetiratsetaam, 250mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1198829	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma SA	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1495054	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	NORMEG 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1544868	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	LEVETIRACETAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
					50						
1545421	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1545960	levetiratsetaam, 500mg	N03AX14	MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Pharmathen S.A.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid (va retigabiin) ei ole meditsiiniliselt sobivad
1077049	levodopa+benserasiid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR, dispergeeruv tablett, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
1082922	levodopa+benserasiid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR, kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
1085161	levodopa+benserasiid, 100mg+25mg	N04BA80	MADOPAR HBS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
1002014	levodopa+benserasiid, 200mg+50mg	N04BA80	MADOPAR, tablett, 100TK	Roche Eesti OÜ	50						
					100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
1599611	levodopa+benserasiid, 200mg+50mg	N04BA80	MADOPAR, tablett, 100TK	First Pharma OÜ	50						
					100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1798072	levodopa+karbidopa, 100mg+25mg	N04BA81	SINEMET 25/100, tablett, 60TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
					50						
1006861	levodopa+karbidopa, 250mg+25mg	N04BA81	SINEMET 25/250, tablett, 100TK	Merck Sharp & Dohme OÜ	50						
					100	G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8	Neuroloog	esmane			
1172854	levodopa+karbidopa+entakapoon, 100mg+25mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1629716	levodopa+karbidopa+entakapoon, 100mg+25mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1172898	levodopa+karbidopa+entakapoon, 150mg+37,5mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1630257	levodopa+karbidopa+entakapoon, 150mg+37,5mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1538580	levodopa+karbidopa+entakapoon, 175mg+43,75mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1368020	levodopa+karbidopa+entakapoon, 200mg+50mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1630527	levodopa+karbidopa+entakapoon, 200mg+50mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1472228	levodopa+karbidopa+entakapoon, 75mg+18,75mg+200mg	N04BA03	STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1629974	levodopa+karbidopa+entakapoon, 75mg+18,75mg+200mg	N04BA03	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1549650	levonorgestreel, 13,5mg	G02BA03	FLEREE, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	50						
					75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
1703955	levonorgestreel, 19,5mg	G02BA03	KYLEENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1009493	levonorgestreel, 52mg	G02BA03	MIRENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK	Bayer AG	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1621752	levonorgestreel+etünüülöstradiool, 0,15mg+0,03mg	G03AA07	LEVERETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UAB Exeltis Baltics	75	Z30-Z30					sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral
					50						
1223064	levotsetirisiin, 0,5mg 1ml	R06AE09	XYZAL, suukaudne lahus, 200ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1138137	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1512065	levotsetirisiin, 5mg	R06AE09	CEZERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1607240	liksisenatiid, 10mcg/20mcg 0.2ml	A10BJ03	LYXUMIA, süstelahus, 3ml 1TK / 3ml 1TK	sanofi-aventis groupe	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1607228	liksisenatiid, 20mcg 0.2ml	A10BJ03	LYXUMIA, süstelahus, 3ml 2TK	sanofi-aventis groupe	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1539288	linagliptiin, 5mg	A10BH05	TRAJENTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1733071	linagliptiin+empagliflosiin, 5mg+10mg	A10BD19	GLYXAMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1733161	linagliptiin+empagliflosiin, 5mg+25mg	A10BD19	GLYXAMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1751206	linesoliid, 600mg	J01XX08	APEL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1044469	lipaas+amülaas+proteaas, 10000TÜ+8000TÜ+600TÜ	A09AA02	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Mylan IRE Healthcare Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1063763	lipaas+amülaas+proteaas, 10000TÜ+8000TÜ+600TÜ	A09AA02	KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	Mylan IRE Healthcare Limited	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1020205	lipaas+amülaas+proteaas, 10000ühik+9000ühik+500ühik	A09AA02	PANGROL 10000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1060434	lipaas+amülaas+proteaas, 20000ühik+12000ühik+900ühik	A09AA02	MEZYM 20 000, gastroresistentne tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
1044470	lipaas+amülaas+proteaas, 25000TÜ+18000TÜ+1000TÜ	A09AA02	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Mylan IRE Healthcare Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			
					50						
1063707	lipaas+amülaas+proteaas, 25000TÜ+18000TÜ+1000TÜ	A09AA02	KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK	Mylan IRE Healthcare Limited	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater	esmane			
					50						
1020182	lipaas+amülaas+proteaas, 25000ühik+22500ühik+1250ühik	A09AA02	PANGROL 25000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1426845	liraglutiid, 6mg 1ml	A10BJ02	VICTOZA, süstelahus pen-süstlis, 3ml 2TK	Novo Nordisk A/S	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
					50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
1300598	lisinopriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB03	DIRONORM, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1501456	lisinopriil+amlodipiin, 20mg+5mg	C09BB03	DIRONORM, tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1111284	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1364510	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1364532	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1364554	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AD04	HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1754692	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG JUNIOR KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1814408	lispro-insuliin, 100TÜ 1ml	A10AB04	LIUMJEV KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	50						
					100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
1713248	lispro-insuliin, 200TÜ 1ml	A10AB04	HUMALOG KWIKPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1063482	loperamiid, 2mg	A07DA03	IMODIUM, kõvakapsel, 20TK	McNeil Healthcare (Ireland) Limited	50						
1503571	loperamiid, 2mg	A07DA03	LOPACUT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	VITABALANS OY	50						
1284320	lopinaviir+ritonaviir, 200mg+50mg	J05AR10	KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1082472	lopinaviir+ritonaviir, 80mg+20mg 1ml	J05AR10	KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1805756	lornoksikaam, 8mg	M01AC05	XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	First Pharma OÜ	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1207167	losartaan, 100mg	C09CA01	LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1210688	losartaan, 100mg	C09CA01	LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1268962	losartaan, 100mg	C09CA01	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1288256	losartaan, 100mg	C09CA01	LOSARTAN ACCORD 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1013735	losartaan, 50mg	C09CA01	LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1207134	losartaan, 50mg	C09CA01	LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1210701	losartaan, 50mg	C09CA01	LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Zentiva, k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1288245	losartaan, 50mg	C09CA01	LOSARTAN ACCORD 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1166059	losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg	C09DA01	LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1217809	losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg	C09DA01	LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1217810	losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg	C09DA01	LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1185195	loteprednool, 0,5%	S01BA14	LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH	50						
7000175	L-tsitrulliin,		L-CITRULLINE , pulber, 100 g N1	SHS	50						
7017476	L-tsitrulliin,		L-CITRULLINE, pulber, 100g N10	SHS International Ltd	50						
1029417	lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml	A10AB01	HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK	Eli Lilly Nederland B.V.	100	O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1					
					50						
1479416	makrogool+naatriumsulfaat, veevaba+naatriumkloriid+kaaliumkloriid+askorbiinhape+naatriumaskorbaat, 100g+7,5g+2,691g+1,015g+0+0/0+0+0+0+4,7g+5,9g	A06AD83	MOVIPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK / 2TK	Norgine B.V.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1566480	mannitool, 40mg	R05CB16	BRONCHITOL, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 280TK	Pharmaxis Europe Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				patsientidele, kellele ravi alfadornaasi ja hüpertoonilise soolalahusega on ebaefektiivne või talumatu. Ravi jätkatakse ravi alustamisel 3 ravikuu järel ja edaspidi 6-kuulise intervalliga hinnatuna, kui saavutatakse ravivastus ehk kopsufunktsioon (hinnatuna FEV1% eeldatavast) ei halvene. Soodustus ei kehti mannitooli ja alfadornaasi kooskasutamisel.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1636602	matsitentaan, 10mg	C02KX04	OPSUMIT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1007222	mebendasool, 100mg	P02CA01	VERMOX 100 MG, tablett, 6TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1008245	mebendasool, 100mg	P02CA01	MEBENDAZOLE-GRINDEKS, tablett, 6TK	AS Grindeks	50						
1136696	mebeveriin, 200mg	A03AA04	DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Mylan Healthcare SIA	50						
1013195	medroksüprogesteroon, 500mg	L02AB02	FARLUTAL, tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	C00-D48	Onkoloog				
1004410	melfalaan, 2mg	L01AA03	ALKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	C00-D48	Onkoloog, Hematoloog				
					50						
1035021	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140680	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOX 15MG, tablett, 20TK	Medochemie Limited	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
1149779	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MEXOLAN 15 MG, tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1175936	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA, tablett, 20TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1189199	meloksikaam, 15mg	M01AC06	LORMED 15 MG, tablett, 20TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
1240254	meloksikaam, 15mg	M01AC06	RECOXA, tablett, 60TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1360189	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MG, tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1560260	meloksikaam, 15mg	M01AC06	MELOX 15MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1035009	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 20TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
1140679	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOX 7,5MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					50						
1146350	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MOVALIS, tablett, 50TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					100	C00-D48					
					75	M15-M19			63,00		
1149746	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MEXOLAN 7,5 MG, tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1360134	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 20TK	ratiopharm GmbH	75	M15-M19			63,00		
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1360156	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	100	C00-D48					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1560271	meloksikaam, 7,5mg	M01AC06	MELOX 7,5MG, tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					75	M15-M19			63,00		
					100	C00-D48					
1006007	melperoon, 25mg	N05AD03	BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Medilink A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1006030	melperoon, 50mg	N05AD03	BURONIL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Medilink A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1123524	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1123535	memantiin, 10mg	N06DX01	AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1614563	memantiin, 10mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1614608	memantiin, 10mg	N06DX01	MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Krka, d.d., Novo mesto	50						
1618747	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	50						
1618781	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	ratiopharm GmbH	50						
1621998	memantiin, 10mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50						
1622023	memantiin, 10mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	50						
1635331	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1635375	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
1648739	memantiin, 10mg	N06DX01	MEMANTINE GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AS Grindeks	50						
1621819	memantiin, 20mg	N06DX01	MANTOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004971	merkaptopuriin, 50mg	L01BB02	PURI-NETHOL, tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
					100	C00-D48	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog, Hematoloog				
1737648	mesalasiin, 1600mg	A07EC02	YALDIGO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
1023815	mesalasiin, 1g	A07EC02	PENTASA, rektaalsuposiit, 28TK	Ferring GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
					50						
1352810	mesalasiin, 1g	A07EC02	PENTASA 1G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 50TK	Ferring GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
					50						
1352854	mesalasiin, 2g	A07EC02	PENTASA 2G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 60TK	Ferring GmbH	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
1146574	mesalasiin, 400mg	A07EC02	ASACOL 400MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
1023826	mesalasiin, 500mg	A07EC02	PENTASA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Ferring GmbH	75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
					50						
1146541	mesalasiin, 500mg	A07EC02	ASACOL, rektaalsuposiit, 20TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Gastroenteroloog, Pediaater				
1184970	mesalasiin, 800mg	A07EC02	ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK	Tillotts Pharma AB	50						
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1034109	metadoon, 1mg 1ml	N07BC02	METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK	Takeda Pharma AS	100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					
					50						
1684155	metadoon, 20mg	N07BC02	METADON DAK, tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
1164798	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORAL 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Laboratori Guidotti S.p.A.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1302949	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFOGAMMA 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1568246	metformiin, 1000mg	A10BA02	METFORMIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1064719	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORAL 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1083169	metformiin, 500mg	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	ratiopharm GmbH	75	E14-E14, E11-E11					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1116380	metformiin, 500mg	A10BA02	METFOGAMMA 500, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1064731	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORAL 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1083158	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1111262	metformiin, 850mg	A10BA02	METFOGAMMA 850, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
					75	E14-E14, E11-E11					
1156609	metformiin, 850mg	A10BA02	METFORMIN SANDOZ 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK	Sandoz GmbH	75	E14-E14, E11-E11					
					50						
1637917	metformiin+dapagliflosiin, 1000mg+5mg	A10BD15	XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1637861	metformiin+dapagliflosiin, 850mg+5mg	A10BD15	XIGDUO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1687136	metformiin+empagliflosiin, 1000mg+12,5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1686955	metformiin+empagliflosiin, 1000mg+5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1687046	metformiin+empagliflosiin, 850mg+12,5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1686865	metformiin+empagliflosiin, 850mg+5mg	A10BD20	SYNJARDY, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1767731	metformiin+ertugliflosiin, 1000mg+2,5mg	A10BD23	SEGLUROMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1767876	metformiin+ertugliflosiin, 1000mg+7,5mg	A10BD23	SEGLUROMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	E14-E14, E11-E11					kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1590599	metformiin+linagliptiin, 1000mg+2,5mg	A10BD11	JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1590465	metformiin+linagliptiin, 850mg+2,5mg	A10BD11	JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1550326	metformiin+saksagliptiin, 1000mg+2,5mg	A10BD10	KOMBOGLYZE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca AB	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1550270	metformiin+saksagliptiin, 850mg+2,5mg	A10BD10	KOMBOGLYZE, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361034	metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD07	JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.
					50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1360965	metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg	A10BD07	JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.
1349401	metformiin+vildagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD08	EUCREAS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1714968	metformiin+vildagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD08	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1720864	metformiin+vildagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD08	DALTEX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1746266	metformiin+vildagliptiin, 1000mg+50mg	A10BD08	VILDAGLIPTIN/METFORMIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1349344	metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg	A10BD08	EUCREAS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1714913	metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg	A10BD08	VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1720796	metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg	A10BD08	DALTEX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1746200	metformiin+vildagliptiin, 850mg+50mg	A10BD08	VILDAGLIPTIN/METFORMIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Teva B.V.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						
1000674	metoklopramiid, 10mg	A03FA01	CERUCAL, tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	C00-D48					
1699050	metoklopramiid, 10mg	A03FA01	METOCLOPRAMIDE ACCORD, tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	C00-D48					
1327643	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 100mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					50						
1370540	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 120mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	100	D63-D63, T86-T86	Nefroloog, Uroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					50						
1327665	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 200mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Pediaater, Uroloog, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1327621	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 50mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Pediaater, Nefroloog				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
1327632	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin, 75mcg 0.3ml	B03XA03	MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	D63-D63, T86-T86	Uroloog, Nefroloog, Pediaater				kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral
					100	D46-D46, D47.1-D47.1	Hematoloog				
1010811	metoprolool, 100mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1019720	metoprolool, 100mg	C07AB02	BETALOC ZOK 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Recordati Ireland Limited	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1224278	metoprolool, 100mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224290	metoprolool, 100mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1672286	metoprolool, 100mg	C07AB02	BLOXAZOC 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1083406	metoprolool, 25mg	C07AB02	BETALOC ZOK 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Recordati Ireland Limited	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224201	metoprolool, 25mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1672130	metoprolool, 25mg	C07AB02	BLOXAZOC 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1009055	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM 50 MG, tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1010800	metoprolool, 50mg	C07AB02	EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva B.V.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1019719	metoprolool, 50mg	C07AB02	BETALOC ZOK 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Recordati Ireland Limited	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1072190	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOPROLOL STADA, tablett, 100TK	Stada Arzneimittel AG	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1224245	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
1224267	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1282160	metoprolool, 50mg	C07AB02	METOPROLOL-RATIOPHARM RETARD 50 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1672174	metoprolool, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					
					50						
1672242	metoprolool, 50mg	C07AB02	BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1001136	metotreksaat, 2,5mg	L04AX03	METHOTREXATE ORION, tablett, 100TK	Orion Corporation	100	C00-D48	Hematoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog, Onkoloog				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
1688744	metotreksaat, 2,5mg	L04AX03	TREXAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1418914	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX03	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 1ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog			5,00	
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1418925	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX03	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 1.25ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog			5,00	
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1547074	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX03	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 0.5ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog			5,00	
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1547120	metotreksaat, 20mg 1ml	L04AX03	EBETREX 20MG/ML, süstelahus süstlis, 0.75ml 5TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog			5,00	
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1304637	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX03	METEX, süstelahus süstlis, 0.2ml 6TK	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater			5,00	

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1304682	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX03	METEX, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater			5,00	
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1304738	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX03	METEX, süstelahus süstlis, 0.4ml 6TK	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH	75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater			5,00	
					75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1304783	metotreksaat, 50mg 1ml	L04AX03	METEX, süstelahus süstlis, 0.5ml 6TK	Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH	75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Pediaater, Reumatoloog			5,00	
					75	M08.0-M08.8, M46.8-M46.8, M05.8-M05.8, M07.0-M07.6, M05.3-M05.3, M45-M45, M06.0-M06.0	Reumatoloog, Pediaater				patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad seedetrakti poolsed kõrvaltoimed
1033658	metronidasool, 1g	G01AF01	ARILIN, vaginaalsuposiit, 2TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1033636	metronidasool, 250mg/100mg	P01AB01	ARILIN, õhukese polümeerikattega tablett + vaginaalsuposiit, 12TK / 6TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008706	metronidasool, 500mg	P01AB01	METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Takeda Pharma AS	50						
1046180	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	ROZEX, geel, 30g 1TK	Galderma International	50						
1223749	metronidasool, 7,5mg 1g	D06BX01	METROSA, geel, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396335	metüülfenidaat, 10mg	N06BA04	MEDIKINET XL 10MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313569	metüülfenidaat, 18mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396368	metüülfenidaat, 20mg	N06BA04	MEDIKINET XL 20MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396391	metüülfenidaat, 30mg	N06BA04	MEDIKINET XL 30MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313581	metüülfenidaat, 36mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1395266	metüülfenidaat, 40mg	N06BA04	MEDIKINET XL 40MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1313660	metüülfenidaat, 54mg	N06BA04	CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	75	F90.0-F90.1	Psühhiaater		6,00	20,00	ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C-GAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					75	F90.0-F90.1	Psühhiaater	esmane	20,00		vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul.
1009099	metüülprednisoloon, 16mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 50TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					50						
					100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Allergoloog-immunoloog, Pediaater				
1009190	metüülprednisoloon, 40mg 1ml	H02AB04	DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog	esmane			
					100	G35-G35	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065754	metüülprednisoloon, 4mg	H02AB04	MEDROL, tablett, 100TK	Pfizer Europe MA EEIG	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	G35-G35	Neuroloog, Pediaater	esmane			
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog-immunoloog				
					75	K50-K51, K73-K74	Pediaater, Gastroenteroloog				
1028102	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, kreem, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
1062009	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN, salv, 15g 1TK	LEO Pharma A/S	75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					
					50						
1133356	metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g	D07AC14	ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 20g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
					75	L20-L20, L40-L40, L23-L23					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1764794	midostauriin, 25mg	L01XE39	RYDAPT, pehmekapsel, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	C92-C92	Hematoloog				esmakordselt diagnoositud ägeda müeloidleukeemia ja FLT3 mutatsiooniga täiskasvanud patsientidele koos standardse antratsükliini ja tsütarabiini induktsioonkeemiaravi ga ning koos suures annuses tsütarabiini konsolideeriva keemiaraviga, millele täieliku ravivastuse korral järgneb säilitusravi ainult midostauriiniga
1024579	mikonasool, 20mg 1g	A01AB09	DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK	Johnson & Johnson UAB	50						
1604337	mirabegroon, 50mg	G04BD12	BETMIGA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Astellas Pharma Europe B.V.	50						
1181607	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTASTAD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1243684	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1273137	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1314683	mirtasapiin, 15mg	N06AX11	MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1170166	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	ESPRITAL 30, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1181797	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTASTAD 30 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1243729	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1273227	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1301522	mirtasapiin, 30mg	N06AX11	MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1243741	mirtasapiin, 45mg	N06AX11	MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK	Orion Corporation	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1154618	moksifloksatsiin, 400mg	J01MA14	AVELOX, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK	Bayer AG	50	J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15					kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1751891	moksifloksatsiin, 400mg	J01MA14	FLOXELAN, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK	Medochemie Limited	50	J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15					kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
					100	F30-F31	Psühhiaater				
1145999	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1155091	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1157778	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1247598	moksonidiin, 0,2mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1146079	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1157857	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
1247677	moksonidiin, 0,3mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1013791	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	PHYSIOTENS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Mylan Healthcare SIA	50						
1146170	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXONIDINHEXAL 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1155259	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1157947	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXOGAMMA 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
1247756	moksonidiin, 0,4mg	C02AC05	MOXONIDIN ACTAVIS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1028933	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, nahalahus, 20ml 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	L23-L23, L20-L20					
					75	L40-L40					
1028944	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, salv, 20g 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	75	L23-L23, L20-L20					
					75	L40-L40					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1028955	mometasoon, 1mg 1g	D07AC13	ELOCON, kreem, 20g 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	L40-L40					
					75	L23-L23, L20-L20					
1028966	mometasoon, 50mcg 1annust	R01AD09	NASONEX, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					75	J30-J30				17,00	
1484298	mometasoon, 50mcg 1annust	R01AD09	NASOMETIN, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	J30-J30				17,00	
1621224	mometasoon, 50mcg 1annust	R01AD09	BRESO, ninasprei, suspensioon, 140annust 1TK	UAB Norameda	75	J30-J30				17,00	
					50						
1274116	montelukast, 10mg	R03DC03	MONTELUKAST TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
1289987	montelukast, 10mg	R03DC03	MONKASTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						
1496415	montelukast, 10mg	R03DC03	MONTELUKAST ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					75	J45-J45				11,00	
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1273722	montelukast, 4mg	R03DC03	MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
1289718	montelukast, 4mg	R03DC03	MONKASTA, närimistablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
1447084	montelukast, 4mg	R03DC03	MONTELUKAST ACCORD, närimistablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
1273845	montelukast, 5mg	R03DC03	MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					75	J45-J45				11,00	
1289831	montelukast, 5mg	R03DC03	MONKASTA, närimistablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	J45-J45				11,00	
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1447242	montelukast, 5mg	R03DC03	MONTELUKAST ACCORD, närimistablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	J45-J45				11,00	
					50						
					75	J45-J45			11,00		mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga
1035740	morfiin, 100mg	N02AA01	VENDAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					
1035717	morfiin, 10mg	N02AA01	VENDAL RETARD 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
1382284	morfiin, 10mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1339376	morfiin, 120mg	N02AA01	MXL 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
					100	C00-D48					
1382307	morfiin, 20mg	N02AA01	SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					50						
					100	C00-D48					
1043222	morfiin, 20mg 1ml	N02AA01	MORFIN DAK 20 MG/ML, süstelahus, 1ml 10TK	Takeda Pharma AS	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1743421	morfiin, 20mg 1ml	N02AA01	MARACEX, süste-/infusioonilahus, 1ml 10TK	AS Kalceks	50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
					100	C00-D48					
1035728	morfiin, 30mg	N02AA01	VENDAL RETARD 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1080289	morfiin, 30mg	N02AA01	MST CONTINUS 30 MG, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 30TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1339422	morfiin, 30mg	N02AA01	MXL 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	50						
					100	C00-D48					
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1035739	morfiin, 60mg	N02AA01	VENDAL RETARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	C00-D48					
					50						
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul
1023556	mükofenoolhape, 250mg	L04AA06	CELLCEPT, kõvakapsel, 100TK	Roche Registration GmbH	50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M36, L94-L94, L10-L10					
1164697	mükofenoolhape, 360mg	L04AA06	MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK	SIA Novartis Baltics	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	M30-M36, L94-L94, L10-L10					
1088344	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Roche Registration GmbH	100	Z94-Z94, T86-T86					
					50						
					75	M30-M36, L94-L94, L10-L10					
1276736	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	M30-M36, L94-L94, L10-L10					
					100	Z94-Z94, T86-T86					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1343270	mükofenoolhape, 500mg	L04AA06	MYFENAX, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva B.V.	75	M30-M36, L94-L94, L10-L10					
					50						
					100	Z94-Z94, T86-T86					
1454879	naatriumbemipariin, 25000RÜ anti Xa 1ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 0.3ml 2TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
1455230	naatriumbemipariin, 25000RÜ anti Xa 1ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 0.4ml 2TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	100	O99.8-O99.8					
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
1193127	naatriumbemipariin, 2500RÜ anti Xa 0.2ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 10TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					50						
					100	O99.8-O99.8					
1193172	naatriumbemipariin, 3500RÜ anti Xa 0.2ml	B01AB12	ZIBOR, süstelahus, 10TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					100	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
1065596	naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 1ml 2TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065529	naatriumenoksapariin, 2000RÜ 0.2ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	100	O99.8-O99.8					
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					50						
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
1745939	naatriumenoksapariin, 2000RÜ 0.2ml	B01AB05	LOSMINA, süstelahus süstlis, 0.2ml 10TK	Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					100	O99.8-O99.8					
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					50						
1065541	naatriumenoksapariin, 4000RÜ 0.4ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					50						
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks
					100	O99.8-O99.8					
1781489	naatriumenoksapariin, 4000RÜ 0.4ml	B01AB05	LOSMINA, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK	Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A.	100	O99.8-O99.8					
					50						
					100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks
					75	M17-M17, S72.7-S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16-M16, S72.0-S72.0					kuni 30 päevaks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065552	naatriumenoksapariin, 6000RÜ 0.6ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.6ml 2TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					100	O99.8-O99.8					
					50						
1065574	naatriumenoksapariin, 8000RÜ 0.8ml	B01AB05	CLEXANE, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	100	I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6					kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel
					50						
					100	O99.8-O99.8					
1201521	naatriumfenüülbutüraat, 500mg	A16AX03	AMMONAPS, tablett, 250TK	Immedica Pharma AB	100	E72.2-E72.2					konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1201543	naatriumfenüülbutüraat, 940mg 1g	A16AX03	AMMONAPS, graanulid, 266g 1TK	Immedica Pharma AB	100	E72.2-E72.2					konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)
1065822	naatriumlevotüroksiin, 100mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E89.0-E89.0, E03-E03, E89.3-E89.3					
					50						
1065866	naatriumlevotüroksiin, 50mcg	H03AA01	L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE, tablett, 100TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	E89.0-E89.0, E03-E03, E89.3-E89.3					
					50						
1448524	naatriumpikosulfaat+magneesiumoksiid+sidrunhape, 10mg+3500mg+12000mg	A06AB80	PICOPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK	Ferring GmbH	50						
1035346	naatriumsulfaat, veevaba+kaaliumkloriid+naatriumkloriid+makrogool+naatriumvesinikkarbonaat, 5,7g+0,75g+1,46g+64g+1,68g	A06AD81	FORTRANS, suukaudse lahuse pulber, 4TK	Ipsen Consumer Healthcare	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1023949	nabumetoon, 1g	M01AX01	RELIFEX, dispergeeruv tablett, 20TK	Meda AB	50						
1205479	nabumetoon, 1g	M01AX01	RELIFEX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Meda AB	50						
1147902	naftidrofurüül, 100mg	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK	Zentiva, k.s.	50						
1147913	naftidrofurüül, 100mg	C04AX21	ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Zentiva, k.s.	50						
1671263	naloksegool, 25mg	A06AH03	MOVENTIG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Kyowa Kirin Holdings B.V.	75	K59.0-K59.0					kroonilise opioid-indutseeritud kõhukinnisuse raviks patsiendile, kes kasutab igapäevaselt opioidi ning kes ei ole vähemalt 2 kuu möödumisel opioidravi alustamisest saavutanud lahtistite abil piisavat raviefekti
1622731	naprokseen, 550mg	M01AE02	NALGESIN FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Krka d.d. Novo mesto	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1644713	naprokseen, 550mg	M01AE02	NALGESIN FORTE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46					
					100	C00-D48					
					50						
					75	M15-M19			63,00		
1437791	naprokseen+esomepra sool, 500mg+20mg	M01AE52	VIMOVO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	AstraZeneca AB	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1072437	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1237429	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL STADA, tablett, 100TK	Stada Arzneimittel AG	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1259355	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBICARD 5MG, tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1259377	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBICARD 5MG, tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1269862	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1269907	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
					50						
1284386	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIVOLOL ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					75	I47-I49	Pediaater, Kardioloog	esmane			
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1344259	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBIPHAR, tablett, 28TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1445149	nebivolool, 5mg	C07AB12	NEBILET, tablett, 90TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					
1780084	nebivolool, 5mg	C07AB12	NOLIBETA, tablett, 90TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1343001	nepafenak, 1mg 1ml	S01BC10	NEVANAC, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						katarakti operatsiooni järgseks kuni 60 päevaseks raviks kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel
1072572	nifedipiin, 10mg	C08CA05	CORINFAR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
1005703	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORDIPIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16					
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	I27.0-I27.0					
					50						
1034301	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16					
					100	I27.0-I27.0					
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
1072550	nifedipiin, 20mg	C08CA05	CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16					
					50						
1023422	nifedipiin, 40mg	C08CA05	CORDIPIN XL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK	Krka d.d. Novo mesto	100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16					
					50						
					75	M34-M34	Reumatoloog, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1342190	nilotiniib, 200mg	L01XE08	TASIGNA, kõvakapsel, 112TK	Novartis Europharm Limited	100	C92.1-C92.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1670688	nintedaniib, 100mg	L01XE31	VARGATEF, pehmekapsel, 120TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	C34-C34	Onkoloog				patsiendile, kelle ravi alustamise nintedaniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks lokaalselt levinud, metastaatilise või lokaalselt retsidiveerunud adenokartsinoomi histoloogilise leiuga mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide raviks pärast esimese valiku keemiaravi, kui patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi), kombinatsioonis dotsetakseeliga (4 kuni 6 ravikuuri) ning soodsa raviefekti püsimisel monoteraapiana kuni haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1675571	nintedaniib, 100mg	L01XE31	OFEV, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1670699	nintedaniib, 150mg	L01XE31	VARGATEF, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	C34-C34	Onkoloog				patsiendile, kelle ravi alustamise nintedaniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks lokaalselt levinud, metastaatilise või lokaalselt retsidiveerunud adenokartsinoomi histoloogilise leiuga mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide raviks pärast esimese valiku keemiaravi, kui patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi), kombinatsioonis dotsetakseeliga (4 kuni 6 ravikuuri) ning soodsa raviefekti püsimisel monoteraapiana kuni haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1675593	nintedaniib, 150mg	L01XE31	OFEV, pehmekapsel, 60TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1261842	nitrendipiin, 10mg	C08CA08	NITRESAN 10 MG, tablett, 50TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1014545	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	LUSOPRESS, tablett, 28TK	Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1261886	nitrendipiin, 20mg	C08CA08	NITRESAN 20 MG, tablett, 50TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1003857	nitrofurantoiin, 50mg	J01XE01	NITROFURANTOIN NYCOMED, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	50						
1131589	norelgestromiin+etünüülöstradiool, 6mg+0,6mg	G03AA13	EVRA, transdermaalne plaaster, 3TK	Janssen-Cilag International N.V.	50						
1175464	noretisteroon+östradiol, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1731013	noretisteroon+östradiol, 0,5mg+1mg	G03FA01	ACTIVELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1030453	noretisteroon+östradiol, 0+1mg/1mg+2mg/0+2mg	G03FB05	TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1116560	noretisteroon+östradiol, 1mg+1mg/0+1mg	G03FB05	NOVOFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK / 16TK	Novo Nordisk A/S	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1030464	noretisteroon+östradiol, 1mg+2mg	G03FA01	KLIOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
1005455	norfloksatsiin, 400mg	J01MA06	NOLICIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1005927	nortriptüliin, 25mg	N06AA10	NORITREN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					75	G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0					
1012374	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	MEDOFLOXINE 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1089402	ofloksatsiin, 200mg	J01MA01	OFLOXIN 200, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Zentiva, k.s.	50						
1009673	okskarbasepiin, 300mg	N03AF02	TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	SIA Novartis Baltics	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1036044	okskarbasepiin, 300mg	N03AF02	APYDAN 300 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1326855	okskarbasepiin, 300mg	N03AF02	OXCARBAZEPINE TEVA 300 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1009684	okskarbasepiin, 600mg	N03AF02	TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	SIA Novartis Baltics	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1036033	okskarbasepiin, 600mg	N03AF02	APYDAN 600 MG, tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1326989	okskarbasepiin, 600mg	N03AF02	OXCARBAZEPINE TEVA 600 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1028483	oksübutüniin, 5mg	G04BD04	DRIPTANE, tablett, 60TK	Mylan Healthcare SIA	75	N31-N31	Neuroloog, Uroloog, Pediaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402568	oksükodoon, 10mg	N02AA05	OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1416293	oksükodoon, 10mg	N02AA05	DOLOCODON 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1526576	oksükodoon, 10mg	N02AA05	OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402580	oksükodoon, 20mg	N02AA05	OXYCONTIN 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1416440	oksükodoon, 20mg	N02AA05	DOLOCODON 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402603	oksükodoon, 40mg	N02AA05	OXYCONTIN 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1416541	oksükodoon, 40mg	N02AA05	DOLOCODON 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 56TK	Zentiva, k.s.	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1526554	oksükodoon, 5mg	N02AA05	OXYCODONE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					50						
					100	R52.1-R52.1	Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1402625	oksükodoon, 80mg	N02AA05	OXYCONTIN 80 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Mundipharma Gesellschaft m.b.H.	50						
					100	C00-D48					patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
					100	R52.1-R52.1	Reumatoloog, Neuroloog, Anestesioloog	esmane			esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist
1041309	oktreotiid, 10mg	H01CB02	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	SIA Novartis Baltics	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Endokrinoloog, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks, kui sellele on eelnenud ravi lühitoimelise somatostatiini analoogiga
1041310	oktreotiid, 20mg	H01CB02	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	SIA Novartis Baltics	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Endokrinoloog, Onkoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks, kui sellele on eelnenud ravi lühitoimelise somatostatiini analoogiga

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1041321	oktreotiid, 30mg	H01CB02	SANDOSTATIN LAR, süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	SIA Novartis Baltics	100	C00-D48, E22.0-E22.0	Onkoloog, Endokrinoloog				neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks, kui sellele on eelnenud ravi lühitoimelise somatostatiini analoogiga
1267714	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1289516	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1326259	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZALASTA, tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1326507	olansapiin, 10mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1342820	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1354294	olansapiin, 10mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1289572	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1326552	olansapiin, 15mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1342886	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1354351	olansapiin, 15mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1267455	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1289459	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1326406	olansapiin, 5mg	N05AH03	ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1342763	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1354104	olansapiin, 5mg	N05AH03	OLANZAPINE ACCORD 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1771196	olapariib, 100mg	L01XX46	LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	100	C48-C48, C57.0-C57.0, C56-C56	Onkoloog				monoteraapiaks levinud (FIGO III ja IV staadium) BRCA mutatsiooniga (idurakuline või somaatiline) madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähiga täiskasvanud patsientide säilitusraviks, kellel on saavutatud ravivastus (täielik või osaline vastus) pärast esimese rea plaatinapõhise keemiaravi lõpetamist või retsidiveerunud haiguse korral patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus kehtib alates 21. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a ning patsientidele, kellele ravim esimese

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											20 ravinädala jooksul positiivset toimet ei avalda.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1771219	olapariib, 150mg	L01XX46	LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	100	C48-C48, C57.0-C57.0, C56-C56	Onkoloog				monoteraapiaks levinud (FIGO III ja IV staadium) BRCA mutatsiooniga (idurakuline või somaatiline) madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähiga täiskasvanud patsientide säilitusraviks, kellel on saavutatud ravivastus (täielik või osaline vastus) pärast esimese rea plaatinapõhise keemiaravi lõpetamist või retsidiveerunud haiguse korral patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus kehtib alates 21. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a ning patsientidele, kellele ravim esimese

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											20 ravinädala jooksul positiivset toimet ei avalda.
1673995	olapariib, 50mg	L01XX46	LYNPARZA, kõvakapsel, 448TK	AstraZeneca AB	100	C48-C48, C57.0-C57.0, C56-C56	Onkoloog				monoteraapiaks retsidiveerunud BRCA mutatsiooniga (idurakuline või somaatiline) madalalt diferentseerunud seroosse epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähiga täiskasvanud patsientide säilitusraviks, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus kehtib alates 21. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2017. a ning patsientidele, kellele ravim esimese 20 ravinädala jooksul positiivset toimet ei avalda.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1407664	olmesartaanmedoksomiil, 10mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1676459	olmesartaanmedoksomiil, 10mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1407833	olmesartaanmedoksomiil, 20mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1676538	olmesartaanmedoksomiil, 20mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1407934	olmesartaanmedoksomiil, 40mg	C09CA08	OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1676617	olmesartaanmedoksomiil, 40mg	C09CA08	OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727434	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 20mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1308563	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1720628	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	OLSSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1727232	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1727579	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+10mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1308451	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1720538	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLSSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1727175	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1727502	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin, 40mg+5mg	C09DB02	OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1452866	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+10mg+12,5mg	C09DX03	SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1452709	olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid, 40mg+5mg+12,5mg	C09DX03	SANORAL HCT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1530672	olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg	C09DA08	CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1530762	olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid, 20mg+25mg	C09DA08	CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1648481	olodaterool+tiotroopium, 2,5mcg+2,5mcg 1pihustus	R03AL06	SPIOLTO RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60pihustus 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1140220	olopatadiin, 1mg 1ml	S01GX09	OPATANOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
1774728	olopatadiin, 1mg 1ml	S01GX09	OLOPATADINE UNIMED PHARMA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK	UNIMED PHARMA spol. s.r.o	50						
1062166	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOLE-RATIOPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	ratiopharm GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1062201	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269222	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEP 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269244	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEP 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1352393	omeprasool, 20mg	A02BC01	OMEPRAZOLE STADA 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Stada Arzneimittel AG	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1423077	omeprasool, 20mg	A02BC01	ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1516250	omeprasool, 20mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1112825	omeprasool, 40mg	A02BC01	GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1269301	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1269323	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1269345	omeprasool, 40mg	A02BC01	OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1137372	oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg	C10AX80	OMACOR, pehmekapsel, 28TK	BASF AS	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1110643	oseltamiviir, 75mg	J05AH02	TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK	Roche Registration GmbH	50						
1649088	oseltamiviir, 75mg	J05AH02	EBILFUMIN, kõvakapsel, 10TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1710379	osimertiniib, 40mg	L01XE35	TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	100	C34-C34	Onkoloog				monoteraapiaks lokaalselt levinud või metastaatilise epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega
1710380	osimertiniib, 80mg	L01XE35	TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	100	C34-C34	Onkoloog				monoteraapiaks lokaalselt levinud või metastaatilise epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1731978	palbotsikliib, 100mg	L01XE33	IBRANCE, kõvakapsel, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni
1731989	palbotsikliib, 125mg	L01XE33	IBRANCE, kõvakapsel, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni
1731967	palbotsikliib, 75mg	L01XE33	IBRANCE, kõvakapsel, 21TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C50-C50	Onkoloog				kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696068	panobinostaat, 10mg	L01XX42	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	Secura Bio Limited	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696091	panobinostaat, 15mg	L01XX42	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	Secura Bio Limited	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1696125	panobinostaat, 20mg	L01XX42	FARYDAK, kõvakapsel, 6TK	Secura Bio Limited	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043020	pantoprasool, 20mg	A02BC02	CONTROLOC 20 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Takeda GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1249758	pantoprasool, 20mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249770	pantoprasool, 20mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1249792	pantoprasool, 20mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1277232	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1418813	pantoprasool, 20mg	A02BC02	OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1441178	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441189	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1537006	pantoprasool, 20mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1043031	pantoprasool, 40mg	A02BC02	CONTROLOC 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	Takeda GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1249646	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1249668	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1249680	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1277344	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1280449	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK	ratiopharm GmbH	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1418835	pantoprasool, 40mg	A02BC02	OZZION, gastroresistentne tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1441190	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1441202	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1537028	pantoprasool, 40mg	A02BC02	PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK	Teva B.V.	75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
					50						
1810268	pantoprasool, 40mg	A02BC02	NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
					75	K25-K27					Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega
1299405	parikaltsitool, 1mcg	H05BX02	ZEMPLAR, pehmekapsel, 28TK	AbbVie SIA	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata)
					50						
1299438	parikaltsitool, 2mcg	H05BX02	ZEMPLAR, pehmekapsel, 28TK	AbbVie SIA	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata)
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1060232	paroksetiin, 20mg	N06AB05	SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1096837	paroksetiin, 20mg	N06AB05	REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1110799	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1185072	paroksetiin, 20mg	N06AB05	PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1244900	paroksetiin, 20mg	N06AB05	ARKETIS 20 MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1110834	paroksetiin, 40mg	N06AB05	PAROXETIN HEXAL 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1245103	paroksetiin, 40mg	N06AB05	ARKETIS 40 MG, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1482027	pasopaniib, 200mg	L01XE11	VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1482050	pasopaniib, 400mg	L01XE11	VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1009404	pentoksüfülliin, 400mg	C04AD03	TRENTAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Takeda GmbH	50						
1147980	pentoksüfülliin, 400mg	C04AD03	PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1028854	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD03	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1473409	pentoksüfülliin, 600mg	C04AD03	VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	G.L. Pharma GmbH	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1168422	perindopriil, 10mg	C09AA04	PRESTARIUM ARGININE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1302860	perindopriil, 4mg	C09AA04	STOPRESS, tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1377233	perindopriil, 4mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1168310	perindopriil, 5mg	C09AA04	PRESTARIUM ARGININE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1302871	perindopriil, 8mg	C09AA04	STOPRESS, tablett, 30TK	Pharmaceutical Works Polpharma S.A.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1377312	perindopriil, 8mg	C09AA04	PRENESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1289101	perindopriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1602852	perindopriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB04	PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1288953	perindopriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1603000	perindopriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB04	PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1499250	perindopriil+amlodipiin, 4mg+10mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1499003	perindopriil+amlodipiin, 4mg+5mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1642980	perindopriil+amlodipiin, 4mg+5mg	C09BB04	PRIAMLO 4MG/5MG, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1288818	perindopriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1602953	perindopriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB04	PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1288672	perindopriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB04	COVERAM, tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1602908	perindopriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB04	PERINDOPRIL/AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1499126	perindopriil+amlodipiin, 8mg+10mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1643048	perindopriil+amlodipiin, 8mg+10mg	C09BB04	PRIAMLO 8MG/10MG, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1499069	perindopriil+amlodipiin, 8mg+5mg	C09BB04	DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1643026	perindopriil+amlodipiin, 8mg+5mg	C09BB04	PRIAMLO 8MG/5MG, tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1588079	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1588091	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+10mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1588024	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1588046	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 10mg+5mg+2,5mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602481	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 4mg+10mg+1,25mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1602571	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 4mg+5mg+1,25mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587977	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+10mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587999	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+10mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1587922	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1587944	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 5mg+5mg+1,25mg	C09BX01	TRIPLIXAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602683	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 8mg+10mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1602795	perindopriil+amlodipiin +indapamiid, 8mg+5mg+2,5mg	C09BX01	CO-DALNESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1339488	perindopriil+indapamiid, 10mg+2,5mg	C09BA04	NOLITERAX 10 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1686720	perindopriil+indapamiid, 10mg+2,5mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1686742	perindopriil+indapamiid, 10mg+2,5mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1229587	perindopriil+indapamiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA04	NOLIPREL ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1544374	perindopriil+indapamiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1600647	perindopriil+indapamiid, 2,5mg+0,625mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1407068	perindopriil+indapamiid, 2mg+0,625mg	C09BA04	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1295894	perindopriil+indapamiid, 4mg+1,25mg	C09BA04	PRENEWEL, tablett, 60TK	Krka, d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1407158	perindopriil+indapamiid, 4mg+1,25mg	C09BA04	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1229879	perindopriil+indapamiid, 5mg+1,25mg	C09BA04	NOLIPREL FORTE ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Les Laboratoires Servier	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1544486	perindopriil+indapamiid, 5mg+1,25mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1600670	perindopriil+indapamiid, 5mg+1,25mg	C09BA04	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1407248	perindopriil+indapamiid, 8mg+2,5mg	C09BA04	CO-PRENESSA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1458367	perindopriil+indapamiid, 8mg+2,5mg	C09BA04	PRENEWEL 8 MG/ 2,5 MG, tablett, 60TK	Krka, d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1104680	pimekroliimus, 10mg 1g	D11AH02	ELIDEL, kreem, 15g 1TK	SIA Meda Pharma	50						
1563454	pioglitasoon, 15mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1498495	pioglitasoon, 30mg	A10BG03	ZIPION 30MG, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.
					50						
1563555	pioglitasoon, 30mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1563757	pioglitasoon, 45mg	A10BG03	PIOGLITAZONE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1023343	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	UCB Pharma Oy Finland	50	G25.3-G25.3					
1813766	piratsetaam, 800mg	N06BX03	NOOTROPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB Ideal Trade Links	50	G25.3-G25.3					
1518881	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	ESBRIET, kõvakapsel, 252TK	Roche Registration GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1750856	pirfenidoon, 267mg	L04AX05	ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 252TK	Roche Registration GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1750801	pirfenidoon, 801mg	L04AX05	ESBRIET, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK	Roche Registration GmbH	100	J84.1-J84.1	Pulmonoloog				patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.
1039889	piroksikaam, 20mg	M01AC01	BREXIN, tablett, 20TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	50						
1039890	piroksikaam, 20mg	M01AC01	BREXIN, suukaudse lahuse pulber, 20TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	50						
1271775	polüstüreensulfonaat, 949mg 1g	V03AE01	SORBISTERIT, suukaudse/rektaalsuspensiooni pulber, 500g 1TK	Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH	50						
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622203	pomalidomiid, 1mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622214	pomalidomiid, 2mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622225	pomalidomiid, 3mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1622236	pomalidomiid, 4mg	L04AX06	IMNOVID, kõvakapsel, 21TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustuseta patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
											ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.
1646175	posakonasool, 100mg	J02AC04	NOXAFIL, gastroresistentne tablett, 24TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1218866	posakonasool, 40mg 1ml	J02AC04	NOXAFIL, suukaudne suspensioon, 105ml 1TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44					vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks
1323256	pramipeksool, 0,088mg	N04BC05	EZAPREV 0,088 MG, tablett, 30TK	UAB Norameda	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1339332	pramipeksool, 0,088mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1041253	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1323267	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	EZAPREV 0,18 MG, tablett, 30TK	UAB Norameda	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1339354	pramipeksool, 0,18mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1450998	pramipeksool, 0,26mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1451023	pramipeksool, 0,52mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637210	pramipeksool, 0,52mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1041264	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	MIRAPEXIN, tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1323313	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	EZAPREV 0,7 MG, tablett, 100TK	UAB Norameda	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1339400	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK	Orion Corporation	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1373824	pramipeksool, 0,7mg	N04BC05	OPRYMEA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451067	pramipeksool, 1,05mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637265	pramipeksool, 1,05mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451135	pramipeksool, 2,1mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1637344	pramipeksool, 2,1mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1451168	pramipeksool, 3,15mg	N04BC05	MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1677719	pramipeksool, 3,15mg	N04BC05	OPRYMEA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1118034	pravastatiin, 20mg	C10AA03	PRAVAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1118056	pravastatiin, 40mg	C10AA03	PRAVAHEXAL 40 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1065776	prednisoloon, 5mg	H02AB06	PREDNISOLON-RICHTER, tablett, 100TK	Gedeon Richter Plc.	100	D59-D59, D69-D69, D60-D64	Hematoloog, Pediaater	esmane			
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	K50-K51, K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				
					100	C00-D48					
					100	E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25	Pediaater, Endokrinoloog	esmane			
					50						
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					75	L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20	Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	J45-J45					
					100	G70-G70	Pediaater, Neuroloog	esmane			
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
1031702	prednisoloon+salitsüülhape, 0,2%+0,4%	D07XA81	ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1655513	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1655546	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1656446	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN TEVA, kõvakapsel, 14TK	Teva B.V.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1657795	pregabaliin, 150mg	N03AX16	BRIEKA, kõvakapsel, 14TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657829	pregabaliin, 150mg	N03AX16	BRIEKA, kõvakapsel, 56TK	Actavis Group PTC ehf	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1693122	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693133	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1695630	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1695663	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1739606	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA k.s, kõvakapsel, 14TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739617	pregabaliin, 150mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA k.s, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1766347	pregabaliin, 150mg	N03AX16	SIRANALEN, kõvakapsel, 14TK	Medochemie Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766370	pregabaliin, 150mg	N03AX16	SIRANALEN, kõvakapsel, 56TK	Medochemie Limited	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
1655760	pregabaliin, 300mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1766415	pregabaliin, 300mg	N03AX16	SIRANALEN, kõvakapsel, 14TK	Medochemie Limited	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1655355	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1655388	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1656334	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN TEVA, kõvakapsel, 14TK	Teva B.V.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657290	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGAGAMMA, kõvakapsel, 14TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657346	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGAGAMMA, kõvakapsel, 56TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G63.2-G63.2	Neuroloog, Endokrinoloog	esmane			ravimi esmase väljakirjutamise õigus neuroloogil, endokrinoloogil ja valuravi arstil juhul, kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1657740	pregabaliin, 75mg	N03AX16	BRIEKA, kõvakapsel, 56TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1693043	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK	Zentiva, k.s.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1693065	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1695438	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 14TK	Accord Healthcare S.L.U.	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1695461	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ACCORD, kõvakapsel, 56TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
1739550	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA k.s, kõvakapsel, 14TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1739572	pregabaliin, 75mg	N03AX16	PREGABALIN ZENTIVA k.s, kõvakapsel, 56TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1766303	pregabaliin, 75mg	N03AX16	SIRANALEN, kõvakapsel, 56TK	Medochemie Limited	75	G63.2-G63.2					kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1077027	primidoon, 250mg	N03AA03	LISKANTIN, tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1020126	propafenoon, 150mg	C01BC03	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Mylan Healthcare SIA	50						
1044526	propafenoon, 150mg	C01BC03	PROPANORM 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1704833	propafenoon, 150mg	C01BC03	PROPAFENONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1020137	propafenoon, 300mg	C01BC03	RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Mylan Healthcare SIA	50						
1704888	propafenoon, 300mg	C01BC03	PROPAFENONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1053223	propranolool, 40mg	C07AA05	PROPRA-RATIOPHARM 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	G43-G43, I47-I49, I15-I15, I10-I13					
1596944	propranolool, 40mg	C07AA05	PROPRANOLOL ACCORD 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	Accord Healthcare B.V.	75	G43-G43, I47-I49, I15-I15, I10-I13					
					50						
1028696	propüültiouratsiil, 50mg	H03BA02	TIOTIL, tablett, 100TK	Leyh Pharma GmbH	50						
1078310	pseudoefedriin+loratadiin, 240mg+10mg	R01BA89	CLARINASE, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 7TK	UAB Bayer	50						
1141311	pseudoefedriin+tsetirisiin, 120mg+5mg	R01BA93	CIRRUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 14TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1074451	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	KALYMIN 60 N, tablett, 100TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			
1664647	püridostigmiinbromiid, 60mg	N07AA02	MESTINON, kaetud tablett, 150TK	Meda Pharma SIA	50						
					100	G70-G70	Neuroloog, Pediaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1750553	raltegraviir, 600mg	J05AX08	ISENTRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kombinatsioonis tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiiniga kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1059218	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 28TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1153527	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMICOR 10 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1169939	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190078	ramipriil, 10mg	C09AA05	AMPRIL 10 MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1190090	ramipriil, 10mg	C09AA05	AMPRIL 10 MG, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1217977	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMICOR 10 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1502345	ramipriil, 10mg	C09AA05	CARDACE, tablett, 56TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1583423	ramipriil, 10mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005826	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1074743	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1153381	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1189953	ramipriil, 2,5mg	C09AA05	AMPRIL 2,5 MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1005859	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 28TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1074754	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 98TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1153459	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1169849	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190034	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIL 5 MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1190056	ramipriil, 5mg	C09AA05	AMPRIL 5 MG, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1217966	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMICOR 5 MG, tablett, 60TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1502198	ramipriil, 5mg	C09AA05	CARDACE 5 MG, tablett, 56TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1583412	ramipriil, 5mg	C09AA05	RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 90TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1510467	ramipriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1712483	ramipriil+amlodipiin, 10mg+10mg	C09BB07	RAMEAM, kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1510388	ramipriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1712539	ramipriil+amlodipiin, 10mg+5mg	C09BB07	RAMEAM, kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1510423	ramipriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1712674	ramipriil+amlodipiin, 5mg+10mg	C09BB07	RAMEAM, kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1510344	ramipriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB07	RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
1712720	ramipriil+amlodipiin, 5mg+5mg	C09BB07	RAMEAM, kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15					
					50						
1512953	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+12,5mg	C09BA05	CARDACE FORTE, tablett, 56TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1513022	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 10mg+25mg	C09BA05	CARDACE FORTE, tablett, 56TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1021936	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 2,5mg+12,5mg	C09BA05	CARDACE COMP, tablett, 28TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1113657	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 2,5mg+12,5mg	C09BA05	CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1190269	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 2,5mg+12,5mg	C09BA05	AMPRIL HL 2,5MG/12,5MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1113680	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 5mg+25mg	C09BA05	CO-RAMICOR 5 MG/25 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1141715	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 5mg+25mg	C09BA05	CARDACE PLUS, tablett, 28TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1190179	ramipriil+hüdroklorotiasiid, 5mg+25mg	C09BA05	AMPRIL HD 5MG/25MG, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1134986	ranitidiin, 150mg	A02BA02	RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1581599	ranitidiin, 150mg	A02BA02	RANITIDINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
1582028	ranitidiin, 300mg	A02BA02	RANITIDINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361652	ranolasiin, 375mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalne klass, kellel esinevad stenokardilised kaebused vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või kellel need ravimid on vastunäidustatud ja kelle puhul on kardioloogide konsiilium, kuhu on kaasatud vähemalt üks regionaalhaigla kardiokirurg või invasiivkardioloog, otsustanud et revaskulariseerimine ei ole võimalik

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361674	ranolasiin, 500mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalne klass, kellel esinevad stenokardilised kaebused vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või kellel need ravimid on vastunäidustatud ja kelle puhul on kardioloogide konsiilium, kuhu on kaasatud vähemalt üks regionaalhaigla kardiokirurg või invasiivkardioloog, otsustanud et revaskulariseerimine ei ole võimalik

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1361685	ranolasiin, 750mg	C01EB18	RANEXA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	75	I20-I20	Kardioloog	esmane			III-IV funktsionaalne klass, kellel esinevad stenokardilised kaebused vaatamata adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega nitropreparaat) või kellel need ravimid on vastunäidustatud ja kelle puhul on kardioloogide konsiilium, kuhu on kaasatud vähemalt üks regionaalhaigla kardiokirurg või invasiivkardioloog, otsustanud et revaskulariseerimine ei ole võimalik
1203422	rasagiliin, 1mg	N04BD02	AZILECT, tablett, 28TK	Teva B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1678215	rasagiliin, 1mg	N04BD02	RALAGO, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1679272	rasagiliin, 1mg	N04BD02	SAGILIA, tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1679340	rasagiliin, 1mg	N04BD02	RASAGILINE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1679531	rasagiliin, 1mg	N04BD02	PARCILECT, tablett, 28TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1011036	raud(III)hüdroksiid-polümaltoos kompleks, 100mg	B03AB80	FERRUM LEK, närimistablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	D50-D50					rasedatele
					50	D50-D50				3,00	

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1011025	raud(III)hüdroksiid-polümaltoos kompleks, 10mg 1ml	B03AB80	FERRUM LEK, siirup, 100ml 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50	D50-D50				3,00	
					75	D50-D50					rasedatele
1073034	ribaviriin, 200mg	J05AP01	REBETOL, kõvakapsel, 140TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						
					100	B18.2-B18.2	Infektsionist, Gastroenteroloog				kroonilise progresseeruva kuluga C-viirushepatiidi raviks
1752410	ribotsikliib, 200mg	L01XE42	KISQALI, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK	Novartis Europharm Limited	100	C50-C50	Onkoloog				kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni
1035289	rilusool, 50mg	N07XX02	RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Sanofi Mature IP	50						
					100	G12.2-G12.2	Neuroloog	esmane			mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele
1644375	riotsiguaat, 0,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1644432	riotsiguaat, 1,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644409	riotsiguaat, 1mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1644498	riotsiguaat, 2,5mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1644465	riotsiguaat, 2mg	C02KX05	ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater				konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsientidele, kellele kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile
1285680	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RISENDROS 35MG, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Zentiva, k.s.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1298257	risedroonhape, 35mg	M05BA07	NORIFAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Adamed Pharma S.A.	75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
					50						
1310757	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RISEDRONATE SODIUM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1310780	risedroonhape, 35mg	M05BA07	RISEDRONATE SODIUM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	M80-M80					patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna
1060456	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1271258	risperidoon, 1mg	N05AX08	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1367670	risperidoon, 1mg	N05AX08	RISPERIDONE ACCORD 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1041028	risperidoon, 1mg 1ml	N05AX08	RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1067509	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPOLEPT 2 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1151974	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1271337	risperidoon, 2mg	N05AX08	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1367726	risperidoon, 2mg	N05AX08	RISPERIDONE ACCORD 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1067521	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPOLEPT 3 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1271416	risperidoon, 3mg	N05AX08	MEDORISPER, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1367760	risperidoon, 3mg	N05AX08	RISPERIDONE ACCORD 3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1067532	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPOLEPT 4 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1152010	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
1367805	risperidoon, 4mg	N05AX08	RISPERIDONE ACCORD 4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	F20-F29, F30-F31	Psühhiaater				
					50						
1381665	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Bayer AG	50						
					75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
1381676	rivaroksabaan, 10mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Bayer AG	75	S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17					kuni 30 päevaks
					50						
1552621	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	I48-I48					
					50						
1552632	rivaroksabaan, 15mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK	Bayer AG	75	I48-I48					
					50						
1552687	rivaroksabaan, 20mg	B01AF01	XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Bayer AG	75	I48-I48					
					50						
1225741	ropinirool, 2mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1436598	ropinirool, 2mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 2MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1225796	ropinirool, 4mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1436633	ropinirool, 4mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1225819	ropinirool, 8mg	N04BC04	REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
					50						
1436677	ropinirool, 8mg	N04BC04	ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	G20-G20	Neuroloog	esmane			
1106053	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1384758	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1396874	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1396896	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva, k.s.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1477267	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN KRKA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1477975	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1477997	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1587360	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
1654174	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1654219	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1684638	rosuvastatiin, 10mg	C10AA07	ROSUVASTATIN TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					
1397099	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1397112	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Zentiva, k.s.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1473476	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1473511	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1477481	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN KRKA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1478190	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1478213	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1587517	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROVASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel
					100	N18-N18					alates III staadiumist
					75	E78-E78					kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					
					50						
1654321	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1654365	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
1684773	rosuvastatiin, 20mg	C10AA07	ROSUVASTATIN TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1477863	rosuvastatiin, 5mg	C10AA07	ROSWERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1653993	rosuvastatiin, 5mg	C10AA07	ROSUVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1620964	rosuvastatiin+esetimiib, 10mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company	75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1621044	rosuvastatiin+esetimiib, 20mg+10mg	C10BA06	DELIPID PLUS, kõvakapsel, 30TK	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company	100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1758102	rosuvastatiin+esetimiib, 20mg+10mg	C10BA06	ROSAZIMIB, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I11-I12					raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					100	N18-N18					patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66					kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust
					50						
1731192	rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 20mg+4mg+1,25mg	C10BX13	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1731316	rosuvastatiin+perindopriil+indapamiid, 20mg+8mg+2,5mg	C10BX13	ROXIPER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused
1632901	ruksolitiniib, 15mg	L01XE18	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1632934	ruksolitiniib, 20mg	L01XE18	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1632877	ruksolitiniib, 5mg	L01XE18	JAKAVI, tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	100	D47.1-D47.1	Hematoloog				konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüuureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1456196	saksagliptiin, 5mg	A10BH03	ONGLYZA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1725522	saksagliptiin+dapagliflosiin, 5mg+10mg	A10BD21	QTERN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	AstraZeneca AB	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1005512	salbutamool, 100mcg 1annust	R03AC02	VENTOLIN, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
					50						
1031308	salbutamool, 200mcg 1annust	R03AC02	VENTOLIN DISKUS, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
1004319	salbutamool, 400mcg 1ml	R03CC02	VENTOLIN SYRUP, siirup, 150ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					50						
1004948	salbutamool, 5000mcg 1ml	R03AC02	VENTOLIN, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J44-J44, J43-J43	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
1664423	salbutamool+beklometasoon, 100mcg+250mcg 1annust	R03AK13	SABACOMB, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK	CHIESI Pharmaceuticals GmbH	75	J45-J45					
1000405	salmeterool, 25mcg 1annust	R03AC12	SEREVENT, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					75	J45-J45					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1007907	salmeterool, 50mcg 1annust	R03AC12	SEREVENT DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
					50						
					75	J45-J45					
1717219	salmeterool+flutikasoon, 25mcg+125mcg	R03AK06	SERKEP, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Mylan S.A.S	75	J45-J45					
					50						
1107346	salmeterool+flutikasoon, 25mcg+125mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1717220	salmeterool+flutikasoon, 25mcg+250mcg	R03AK06	SERKEP, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	Mylan S.A.S	75	J45-J45					
					50						
1107357	salmeterool+flutikasoon, 25mcg+250mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1107335	salmeterool+flutikasoon, 25mcg+50mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					
1037607	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+100mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE DISKUS 100, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	75	J45-J45					
					50						
1636466	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg	R03AK06	AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					50						
1037595	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE DISKUS 250, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1636512	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg	R03AK06	AIRFLUSAL FORSPIRO, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	J45-J45					
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1153167	salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg 1annust	R03AK06	SERETIDE DISKUS 500, annustatud inhalatsioonipulber, 60annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1391789	sapropteriin, 100mg	A16AX07	KUVAN, lahustuv tablett, 120TK	BioMarin International Limited	100	E70.0-E70.1				18,00	konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719031	seleksipaag, 1000mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719042	seleksipaag, 1200mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719053	seleksipaag, 1400mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719064	seleksipaag, 1600mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1718973	seleksipaag, 200mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1718984	seleksipaag, 200mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 140TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719008	seleksipaag, 400mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pediaater, Pulmonoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719019	seleksipaag, 600mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1719020	seleksipaag, 800mcg	B01AC27	UPTRAVI, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Janssen-Cilag International N.V.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog				NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliiniretseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE-5) inhibiitorist

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1788509	semaglutiid, 0,25mg 1annuses	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annust 1TK	Novo Nordisk A/S	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumisega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1788510	semaglutiid, 0,5mg 1annuses	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annust 1TK	Novo Nordisk A/S	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumisega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1788521	semaglutiid, 1mg 1annuses	A10BJ06	OZEMPIC, süstelahus pen-süstlis, 4annust 1TK	Novo Nordisk A/S	50	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi raviks rasvumisega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud
1027066	sertindool, 12mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1027077	sertindool, 16mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1027088	sertindool, 20mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	H. LUNDBECK A/S	100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1027055	sertindool, 4mg	N05AE03	SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid
1013746	sertraliin, 100mg	N06AB06	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1160615	sertraliin, 100mg	N06AB06	SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1189762	sertraliin, 100mg	N06AB06	ERSET, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Rivopharm Ltd	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1669989	sertraliin, 100mg	N06AB06	SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1008638	sertraliin, 50mg	N06AB06	ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1143100	sertraliin, 50mg	N06AB06	ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1160569	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1189841	sertraliin, 50mg	N06AB06	ERSET, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Rivopharm Ltd	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1239218	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1669888	sertraliin, 50mg	N06AB06	SERTRALINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1422425	sevelameer, 800mg	V03AE02	RENVELA, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Genzyme Europe B.V.	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
1484984	sevelameer, 800mg	V03AE02	SEVELAMER AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK	Auxilia Pharma OÜ	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l)
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1221039	sildenafiil, 20mg	G04BE03	REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Upjohn EESV	50	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater, Kardioloog				
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
1702987	sildenafiil, 20mg	G04BE03	SILDENAFIL TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Teva Pharma B.V.	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Kardioloog, Pulmonoloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1729166	sildenafiil, 20mg	G04BE03	MYSILDECARD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Mylan S.A.S	100	I27.0-I27.0	Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
					50	I27.0-I27.0	Pediaater, Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog				
1734117	sildenafiil, 20mg	G04BE03	GRANPIDAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Accord Healthcare S.L.U.	50	I27.0-I27.0	Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog				
					100	I27.0-I27.0	Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1755378	sildenafiil, 20mg	G04BE03	SILUNGO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	UAB Norameda	50	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Kardioloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel
1010271	simvastatiin, 10mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1080166	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1083934	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1334449	simvastatiin, 10mg	C10AA01	SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1594447	simvastatiin, 10mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
1010260	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1080177	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1083956	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1334539	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1594458	simvastatiin, 20mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1621493	simvastatiin, 20mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	Hexal AG	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1083978	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	ratiopharm GmbH	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1086218	simvastatiin, 40mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	N18-N18					
					50						
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1129700	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Hexal AG	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					50						
					100	N18-N18					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1334629	simvastatiin, 40mg	C10AA01	SIMVASTATIN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	N18-N18					
					75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
1594469	simvastatiin, 40mg	C10AA01	VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12					
					100	N18-N18					
					50						
1107739	siroliimus, 1mg	L04AA10	RAPAMUNE, kaetud tablett, 30TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D18.1-D18.1	Pulmonoloog				lümfangioleiomüomatosi näidustusel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286568	sitagliptiin, 100mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286445	sitagliptiin, 25mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1286502	sitagliptiin, 50mg	A10BH01	JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Merck Sharp & Dohme B.V.	50						ravimi väljakirjutamise õigus on patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi sitagliptiini sisaldavate ravimpreparaatidega on alustatud enne 01.01.2019.a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1725825	sofosbuviir+velpatasviir, 400mg+100mg	J05AP55	EPCLUSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Gilead Sciences Ireland UC	100	B18.2-B18.2	Gastroenteroloog, Infektsionist				sõltumata genotüübist, kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks patsientidele, kellel esineb mõõdukas või raske maksafibroos (F2-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning sõltumata maksafibroosi astmest patsientidele, kellel kaasuvalt esineb krüoglobulineemia (D89.1), kaasasündinud verehaigus (D56-D57; D66-D68) või kellel on maksasiirik (Z94.4)
1597440	solifenatsiin, 10mg	G04BD08	SOLIFENACIN PMCS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1686517	solifenatsiin, 10mg	G04BD08	TAMISTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
1597372	solifenatsiin, 5mg	G04BD08	SOLIFENACIN PMCS 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1685932	solifenatsiin, 5mg	G04BD08	TAMISTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Medochemie Limited	50						
1041185	somatropiin, 12mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1369009	somatropiin, 3,3mg 1ml	H01AC01	OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 5TK	Sandoz GmbH	50						
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1022072	somatropiin, 5,3mg	H01AC01	GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
1415528	somatropiin, 5,83mg 1ml	H01AC01	SAIZEN 5,83 MG/ML, süstelahus kolbampullis, 1.03ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
1369032	somatropiin, 6,7mg 1ml	H01AC01	OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 1TK	Sandoz GmbH	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
1415540	somatropiin, 8mg 1ml	H01AC01	SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						
1415551	somatropiin, 8mg 1ml	H01AC01	SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus kolbampullis, 2.5ml 1TK	Merck Serono S.p.A.	100	E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18	Endokrinoloog				kuni kasvutsoonide sulgumiseni
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1249938	sorafeniib, 200mg	L01XE05	NEXAVAR, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	Bayer AG	100	C22-C22	Onkoloog				kuni haiguse progresseerumiseni,ku i ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi sorafeniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
					100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1034480	sotalool, 80mg	C07AA07	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 20TK	Hexal AG	75	I47-I49					
					50						
1071863	sotalool, 80mg	C07AA07	SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK	Hexal AG	75	I47-I49					
					50						
1001091	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	75	I50-I50					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15					
					75	I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1689060	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1689071	spironolaktoon, 100mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1000944	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	75	I15-I15					
					75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
					75	I10-I13					
					50						
1014848	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	VEROSPIRON, tablett, 20TK	Gedeon Richter Plc.	75	I15-I15					
					75	I50-I50					
					75	I10-I13					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1688946	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	I27.0-I27.0					
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1688957	spironolaktoon, 25mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	100	I27.0-I27.0					
					50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1001013	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 20TK	Takeda Pharma AS	50						
					75	I10-I13					
					75	I50-I50					
					75	I15-I15					
					100	I27.0-I27.0					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1042018	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	VEROSPIRON, kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	100	I27.0-I27.0					
					75	I50-I50					
					50						
					75	I15-I15					
					75	I10-I13					
1071650	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRIX, tablett, 100TK	Takeda Pharma AS	75	I15-I15					
					75	I10-I13					
					50						
					75	I50-I50					
					100	I27.0-I27.0					
1689004	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1689015	spironolaktoon, 50mg	C03DA01	SPIRONOLACTONE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Accord Healthcare B.V.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
					100	I27.0-I27.0					
1280056	stiripentool, 250mg	N03AX17	DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1280146	stiripentool, 250mg	N03AX17	DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1280089	stiripentool, 500mg	N03AX17	DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1280113	stiripentool, 500mg	N03AX17	DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK	Biocodex	100	G40-G40	Neuroloog				koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1008818	sulfametoksasool+trimetoprim, 40mg+8mg 1ml	J01EE01	BACTRIM, siirup, 100ml 1TK	EUMEDICA Pharmaceuticals GmbH	100	Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24	Infektsionist				
					50						
1016086	sulfametoksasool+trimetoprim, 800mg+160mg	J01EE01	BERLOCID, tablett, 20TK	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	100	Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24	Infektsionist				
					50						
1023455	sulfasalasiin, 500mg	A07EC01	SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					75	M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46	Reumatoloog, Pediaater	esmane			
					75	K51-K51, K50-K50	Pediaater, Gastroenteroloog				
1040612	sulpiriid, 100mg	N05AL01	BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AS Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				
1705115	sulpiriid, 100mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	AS Grindeks	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						
1040601	sulpiriid, 200mg	N05AL01	BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AS Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				
1705126	sulpiriid, 200mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	AS Grindeks	100	F20-F29	Psühhiaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1040623	sulpiriid, 50mg	N05AL01	BETAMAKS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	AS Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				
1705081	sulpiriid, 50mg	N05AL01	BETAMAKS, tablett, 30TK	AS Grindeks	50						
					100	F20-F29	Psühhiaater				
1018482	sultamitsilliin, 375mg	J01CR04	UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1139914	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1139947	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1234213	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	CINIE 100 MG, tablett, 6TK	Zentiva, k.s.	50						
1234505	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	SUMATRIPTAN STADA, tablett, 6TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1278053	sumatriptaan, 100mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1139880	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1139903	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1234156	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	CINIE 50 MG, tablett, 6TK	Zentiva, k.s.	50						
1277995	sumatriptaan, 50mg	N02CC01	SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK	Actavis Group PTC ehf	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353305	sunitiniib, 12,5mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353293	sunitiniib, 25mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1353282	sunitiniib, 50mg	L01XE04	SUTENT, kõvakapsel, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	C64-C64	Onkoloog				IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena
1113422	zidovudiin, 10mg 1ml	J05AF01	RETROVIR, suukaudne lahus, 200ml 1TK	Viiv Healthcare B.V.	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1036460	zidovudiin+lamivudiin, 300mg+150mg	J05AR01	COMBIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	ViiV Healthcare BV	50		Infektsionist				HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1005815	zuklopentiksool, 10mg	N05AF05	CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
1006232	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1065226	zuklopentiksool, 200mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 10TK	H. LUNDBECK A/S	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1006322	zuklopentiksool, 50mg 1ml	N05AF05	CISORDINOL-ACUTARD, süstelahus, 1ml 10TK	H. LUNDBECK A/S	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1679036	tadalafiil, 20mg	G04BE08	TADALAFIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Accord Healthcare B.V.	50	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog				
					100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog, Reumatoloog				NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1379303	tafluprost, 0,015mg 1ml	S01EE05	TAFLOTAN, silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris, 0.3ml 30TK	Santen Oy	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale
1179840	takroliimus, 0,3mg 1g	D11AH01	PROTOPIC, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1294646	takroliimus, 0,5mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi on alustatud enne 01.07.2020

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1776618	takroliimus, 0,5mg	L04AD02	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1661105	takroliimus, 0,75mg	L04AD02	ENVARSUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1294680	takroliimus, 1mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi on alustatud enne 01.07.2020
1661149	takroliimus, 1mg	L04AD02	ENVARSUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1776652	takroliimus, 1mg	L04AD02	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1179851	takroliimus, 1mg 1g	D11AH01	PROTOPIC, salv, 30g 1TK	LEO Pharma A/S	50						
1488337	takroliimus, 3mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi on alustatud enne 01.07.2020

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1776731	takroliimus, 3mg	L04AD02	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt
1661161	takroliimus, 4mg	L04AD02	ENVARSUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Chiesi Farmaceutici S.p.A.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1294668	takroliimus, 5mg	L04AD02	ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Astellas Pharma Europe B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi on alustatud enne 01.07.2020
1776775	takroliimus, 5mg	L04AD02	DAILIPORT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	Z94-Z94, T86-T86					patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1347230	talidomiid, 50mg	L04AX02	THALIDOMIDE CELGENE, kõvakapsel, 28TK	Celgene Europe BV	100	C90.0-C90.0	Hematoloog				ravimi väljakirjutamise õigus hulgimüeloomi suukaudseks mono- või kombinatsioonraviks
1015704	tamoksifeen, 20mg	L02BA01	TAMOXIFEN "EBEWE", tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	100	C50-C50	Günekoloog, Üldkirurg				rinnavähi adjuvantraviks
					100	D18.1-D18.1	Onkoloog, Pulmonoloog				
					100	C00-D48	Onkoloog				
					50						
1188143	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1188378	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
1188402	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN AUXILIA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 60TK	Auxilia Pharma OÜ	50						
1188480	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN LANNACHER, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1188659	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TAMSULOSIN STADA, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1195826	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	OMSAL, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Gedeon Richter Plc.	50						
1206773	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	FOKUSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Takeda GmbH	50						
1436015	tamsulosiin, 0,4mg	G04CA02	TANYZ ERAS 0.4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1390463	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	COMBODART, kõvakapsel, 30TK	GlaxoSmithKline Eesti OÜ	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1769609	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSULOSIN OLAINFARM, kõvakapsel, 30TK	JSC Olainfarm	50						
1769632	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSULOSIN MYLAN, kõvakapsel, 30TK	Mylan Ireland Limited	50						
1769744	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTROZEN, kõvakapsel, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
1776821	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA, kõvakapsel, 30TK	Teva B.V.	50						
1782660	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	TADUSTA, kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1785089	tamsulosiin+dutasteriid, 0,4mg+0,5mg	G04CA52	DUTASTERIDE/TAMSULOSIN EXELTIS, kõvakapsel, 30TK	Exeltis Baltics, UAB	50						
1046292	telmisartaan, 40mg	C09CA07	MICARDIS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1395424	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TELMISARTAN-RATIOPHARM 40MG, tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1430233	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TELMISARTAN SANDOZ 40 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1482263	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1482274	telmisartaan, 40mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1046258	telmisartaan, 80mg	C09CA07	MICARDIS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1395569	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG, tablett, 28TK	ratiopharm GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1430389	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TELMISARTAN SANDOZ 80 MG, tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1482331	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1482342	telmisartaan, 80mg	C09CA07	TOLURA, tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1499452	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg	C09DB04	TWYNSTA, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1643161	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg	C09DB04	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1707049	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg	C09DB04	TELDIPIN, tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1499384	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg	C09DB04	TWYNSTA, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1643071	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg	C09DB04	MIXOR, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1706969	telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg	C09DB04	TELDIPIN, tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1609613	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 40mg+12,5mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1114793	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1566615	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD, tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1566996	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TEZEO HCT 80 MG/12,5 MG, tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1567267	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1609691	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1612910	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK	Teva B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1676954	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1367524	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	MICARDISPLUS, tablett, 28TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1566705	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD, tablett, 30TK	TAD Pharma GmbH	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1567379	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TELMISARTAN /HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1609770	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TOLUCOMBI, tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1613045	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA, tablett, 28TK	Teva B.V.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1677045	telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+25mg	C09DA07	TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ACCORD, tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1458963	temosolomiid, 100mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1462115	temosolomiid, 100mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1534676	temosolomiid, 100mg	L01AX03	BLASTOMAT 100 MG, kõvakapsel, 5TK	Alvogen Ipco S.a.r.l.	100	C71-C71	Pediaater – hematoloog-onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1462137	temosolomiid, 140mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1534698	temosolomiid, 140mg	L01AX03	BLASTOMAT 140 MG, kõvakapsel, 5TK	Alvogen Ipco S.a.r.l.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1458941	temosolomiid, 20mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1462092	temosolomiid, 20mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1534654	temosolomiid, 20mg	L01AX03	BLASTOMAT 20 MG, kõvakapsel, 5TK	Alvogen Ipco S.a.r.l.	50						
					100	C71-C71	Pediaater – hematoloog-onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1459021	temosolomiid, 250mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK	Teva B.V.	100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				
					100	C71-C71	Onkoloog, Pediaater – hematoloog-onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
					50						
1462171	temosolomiid, 250mg	L01AX03	TEMOZOLOMIDE ACCORD, kõvakapsel, 5TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	C71-C71	Pediaater – hematoloog-onkoloog, Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1)
1736513	tenofoviiralafenamiid, 25mg	J05AF13	VEMLIDY, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Gilead Sciences Ireland UC	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734825	tenofoviirdisoproksiil, 245mg	J05AF07	TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Mylan S.A.S	100	B18.0-B18.1	Gastroenteroloog, Infektsionist				kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks
1678541	tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin, 245mg+200mg	J05AR03	EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva B.V.	50	Z29.2-Z29.2	Infektsionist				kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule
					100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
1732003	tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin, 245mg+200mg	J05AR03	EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50	Z29.2-Z29.2	Infektsionist				kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule
					100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734612	tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin, 245mg+200mg	J05AR03	EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka, d.d. Novo mesto	100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
					50	Z29.2-Z29.2	Infektsionist				kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule
1735905	tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin, 245mg+200mg	J05AR03	EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Mylan S.A.S	100	Z20.6-Z20.6	Infektsionist				kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega
					50	Z29.2-Z29.2	Infektsionist				kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule
1124031	teofülliin, 200mg	R03DA04	RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1124042	teofülliin, 300mg	R03DA04	RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Orion Corporation	75	J45-J45					
					50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1158757	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1176308	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 14TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1176319	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1176353	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 56TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1245406	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFINE OLAINFARM 250MG, tablett, 28TK	JSC Olainfarm	50						
1681501	terbinafiin, 250mg	D01BA02	TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1624092	teriflunomiid, 14mg	L04AA31	AUBAGIO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	sanofi-aventis groupe	100	G35-G35	Neuroloog	esmane			konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks patsientidele, kellele beetainterferoon või glatirameeratsetaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või talumatuks
1022623	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA03	SUSTANON, süstelahus, 1ml 1TK	Aspen Pharma Trading Limited	100	E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98-Q98	Günekoloog, Endokrinoloog				
					50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1169445	testosteroon, 250mg 1ml	G03BA03	NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK	Bayer AG	50						
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					100	E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98-Q98	Günekoloog, Endokrinoloog				
1343898	tetrabenasiin, 25mg	N07XX06	TETMODIS, tablett, 112TK	AOP Orphan Pharmaceuticals AG	100	G10-G10	Neuroloog	esmane			hüperkineetiliste motoorsete häiretega Huntingtoni tõve raviks
1436835	tianeptiin, 12,5mg	N06AX14	SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1436846	tianeptiin, 12,5mg	N06AX14	SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1506585	tikagreloor, 90mg	B01AC24	BRILIQUE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	AstraZeneca AB	50						
					75	Z95-Z95, I21-I22, I25.2-I25.2	Kardioloog, Sisearst	esmane			müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel
1038956	timolool, 1mg 1g	S01ED01	TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1252976	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	GANFORT, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Allergan Pharmaceuticals Ireland	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1720134	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1720145	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml 3TK	Teva B.V.	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1720178	timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml	S01ED82	BIMATOPROST/TIMOLOL MYLAN, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK	Mylan S.A.S	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1392207	timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg 1ml	S01ED83	AZARGA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1039799	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	COSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1420243	timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml	S01ED80	DORZOLAMIDE/TIMOLOL ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA ELVIM	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1088254	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	XALACOM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1445161	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	ratiopharm GmbH	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1445172	timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml	S01ED84	LATIRA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK	ratiopharm GmbH	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1618141	timolool+tafluprost, 5mg+15mcg 1ml	S01ED85	TAPTIQOM, silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris, 0.3ml 30TK	Santen Oy	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoteraapia säilitusainevaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku
1243763	timolool+travoprost, 5mg+40mcg 1ml	S01ED81	DUOTRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1716656	timolool+travoprost, 5mg+40mcg 1ml	S01ED81	TRAVOPROST/TIMOLOL MYLAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Mylan S.A.S	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1004375	tioguaniin, 40mg	L01BB03	LANVIS, tablett, 25TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						
1111341	tiokthape (alfa-lipoehape), 600mg	A16AX01	THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Meda Pharma GmbH & Co. KG	50						
1303276	tiokthape (alfa-lipoehape), 600mg	A16AX01	THIOGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
1511301	tiotroopium, 2,5mcg 1annust	R03BB04	SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60annust 1TK	Boehringer Ingelheim International GmbH	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1173822	tisanidiin, 2mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	SIA Novartis Baltics	75	G82-G82, G81-G81					
					50						
1211599	tisanidiin, 4mg	M03BX02	SIRDALUD, tablett, 30TK	SIA Novartis Baltics	50						
					75	G82-G82, G81-G81					
1553880	tobramütsiin, 28mg	J01GB01	TOBI PODHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 224TK	Mylan IRE Healthcare Limited	100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel
1646827	tobramütsiin, 300mg 5ml	J01GB01	TOBRAMYCIN VIA PHARMA, nebuliseeritav lahus, 56TK	UAB Via pharma	100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel
1012543	tobramütsiin, 3mg 1g	S01AA12	TOBREX, silmasalv, 3.5g 1TK	SIA Novartis Baltics	50						
1150120	tobramütsiin, 3mg 1ml	S01AA12	TOBREX 2X, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA Novartis Baltics	50						
7000119	toitained ilma fenüülalaniinita,		PHLEXY-10 DRINK MIX , pulber, 20g N30	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						
7000131	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	50						
					100	E70.0-E70.1					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7000142	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						
7000153	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						
7000164	toitained ilma fenüülalaniinita,		XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4	SHS International	100	E70.0-E70.1					
					50						
7000186	toitained ilma fenüülalaniinita,		DUOCAL Supersoluble , pulber, 400 g	SHS	100	E70.0-E70.1					
					50						
7002504	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU-EXPRESS, pulber, 25g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7002515	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU-GEL, pulber, 20g N30	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7002896	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU ANAMIX INFANT, pulber, 400g	SHS International Ltd	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7006081	toitained ilma fenüülalaniinita,		AVONIL POWDER , suukaudne pulber, 500g N1	PreKUlab Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7017577	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU A Formula, pulber, 400g N1	UAB Pharm House	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7017588	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU B Formula, pulber, 500g N1	UAB Pharm House	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					
7015744	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy berries 20, suukaudne lahus, 125ml N30	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7004922	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Squeezie, suukaudne pasta, 85 g manustamisvalmis toitainesegu kotikeses, ühes karbis on 30 kotikest (2550 g)	Vitaflo International Ltd.	100	E70.0-E70.1					
7015755	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy berries 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7017599	toitained ilma fenüülalaniinita,		COMIDA PKU B Formula Orange, pulber, 500g N1	UAB Pharm House	100	E70.1-E70.1, E70.0-E70.0					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
7015777	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy tropical 10, suukaudne lahus, 62,5ml N60	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
7015766	toitained ilma fenüülalaniinita,		PKU Lophlex LQ Juicy tropical 20, suukaudne lahus, 125ml N30	SHS International Ltd	100	E70.0-E70.1					
1371248	tokofersolaan, 50mg 1ml	A11HA08	VEDROP, suukaudne lahus, 60ml 1TK	Recordati Rare Diseases	100	E84-E84, Q44-Q44	Pediaater			19,00	raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri ühise) otsuse alusel
1430086	tokofersolaan, 50mg 1ml	A11HA08	VEDROP, suukaudne lahus, 20ml 1TK	Recordati Rare Diseases	100	E84-E84, Q44-Q44	Pediaater			19,00	raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele patsientidele konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri ühise) otsuse alusel
1284498	tolterodiin, 2mg	G04BD07	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
1795877	tolterodiin, 2mg	G04BD07	UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	50						
1503762	tolterodiin, 4mg	G04BD07	UROFLOW 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
1076778	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1309878	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	75	G43-G43					
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1456488	topiramaat, 100mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA ELVIM	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G43-G43					
1076846	topiramaat, 200mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G43-G43					
					50						
1076688	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1309812	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
1456444	topiramaat, 25mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA ELVIM	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G43-G43					
1076734	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	UAB JOHNSON & JOHNSON	50						
					75	G43-G43					
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
1309834	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Orion Corporation	50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1456466	topiramaat, 50mg	N03AX11	TOPIRAMATE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	SIA ELVIM	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid
					50						
					75	G43-G43					
1158050	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1771332	torasemiid, 100mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 100 MG, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1032332	torasemiid, 10mg	C03CA04	TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1166015	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1422717	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1770892	torasemiid, 10mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1032321	torasemiid, 200mg	C03CA04	TRIFAS 200 MG, tablett, 30TK	Menarini International Operations Luxembourg S.A.	50						
1158106	torasemiid, 200mg	C03CA04	TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK	Hexal AG	50						
1165957	torasemiid, 5mg	C03CA04	TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
1015399	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMAL, rektaalsuposiit, 5TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1032691	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER, rektaalsuposiit, 5TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1043525	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1075665	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1075890	tramadool, 100mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1174621	tramadool, 100mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1041545	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1085857	tramadool, 150mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174632	tramadool, 150mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1759743	tramadool, 150mg	N02AX02	OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1041556	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK	Stada Arzneimittel AG	50						
1085879	tramadool, 200mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1174643	tramadool, 200mg	N02AX02	MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Medochemie Ltd	50						
1759822	tramadool, 200mg	N02AX02	OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1015580	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK	Krka d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1032679	tramadool, 50mg	N02AX02	TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	G.L. Pharma GmbH	50						
1656952	trametiniib, 0,5mg	L01XE25	MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning eelneva 3 ravikuu järel (ravi alustamisel) ja edaspidi 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi trametiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1656985	trametiniib, 2mg	L01XE25	MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Novartis Europharm Limited	100	C43-C43	Onkoloog				konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ning eelneva 3 ravikuu järel (ravi alustamisel) ja edaspidi 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi trametiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2018.
1074765	trandolapriil, 2mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	Mylan Healthcare SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1327520	trandolapriil, 4mg	C09AA10	GOPTEN, kõvakapsel, 28TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1233290	trandolapriil+verapamiil, 2mg+180mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1377660	trandolapriil+verapamiil, 4mg+240mg	C09BB10	TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK	Mylan Healthcare SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1083316	traneksaamhape, 500mg	B02AA02	CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Meda AB	50						
1130454	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Novartis Europharm Limited	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1600614	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	BONDULC, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
1608027	travoprost, 40mcg 1ml	S01EE04	TRAVOPROST ZENTIVA, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK	Zentiva, k.s.	100	H40-H42	Oftalmoloog	esmane			
					50						
1186040	treprostiniil, 1mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud
1186062	treprostiniil, 2,5mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1186073	treprostiniil, 5mg 1ml	B01AC21	REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK	Ferrer Internacional S.A.	100	I27.0-I27.0	Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater				NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kopsusiirdamise järjekorras olevale patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud
1008425	triamtsinoloon, 40mg 1ml	H02AB08	KENALOG, süstesuspensioon, 1ml 5TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1716319	trifluridiin+tipiratsiil, 15mg+6,14mg	L01BC83	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1716331	trifluridiin+tipiratsiil, 15mg+6,14mg	L01BC83	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks
1716342	trifluridiin+tipiratsiil, 20mg+8,19mg	L01BC83	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1716364	trifluridiin+tipiratsiil, 20mg+8,19mg	L01BC83	LONSURF, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	100	C18-C20	Onkoloog				III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja irinotekaanipõhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või osutunud talumatuks
1014422	triheksüfenidüül, 2mg	N04AA01	CYCLODOL, tablett, 50TK	AS Grindeks	50						
1109641	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	PREDUCTAL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Les Laboratoires Servier	50						
1293162	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	TRIMETAZIDINE TEVA 35MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK	Teva Pharma B.V.	50						
1401411	trimetasidiin, 35mg	C01EB15	TRIMETAZIDINE RIVOPHARM, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK	Rivopharm Ltd	50						
1016312	trimetoprim, 100mg	J01EA01	TRIMETOP 100MG, tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1400421	triptoreliin, 11,25mg	L02AE04	DIPHERELINE 11,25 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kokkuvõttes kuni 2 aasta vältel
					50						
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
					75	E22.8-E22.8	Endokrinoloog, Pediaater				
					100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1040397	triptoreliin, 3,75mg	L02AE04	DIPHERELINE 3,75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK	Ipsen Pharma	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					75	E22.8-E22.8	Pediaater, Endokrinoloog				
					100	C61-C61	Onkoloog, Uroloog				lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kokkuvõttes kuni 2 aasta vältel
					50						
					75	N80-N80	Günekoloog				III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele
1007963	tromantadiin, 1%	D06BB02	VIRU-MERZ SEROL GEEL, geel, 2g 1TK	Merz Pharmaceuticals GmbH	50						
1090189	trospiumkloriid, 15mg	G04BD09	SPASMED 15, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
1025064	tsefadroksiil, 1g	J01DB05	DURACEF, lahustuv tablett, 10TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1027134	tsefadroksiil, 500mg	J01DB05	DURACEF, kõvakapsel, 12TK	Bausch Health Ireland Limited	50						
1067318	tsefadroksiil, 50mg 1ml	J01DB05	DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK	Bausch Health Ireland Limited	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1068320	tsefprosiil, 250mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
1068375	tsefprosiil, 500mg	J01DC10	CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
1028506	tsefprosiil, 50mg 1ml	J01DC10	CEFZIL, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.	50						
1007110	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1438387	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1659922	tsefuroksiim, 250mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1137350	tsefuroksiim, 25mg 1ml	J01DC02	ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1007143	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1287840	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1438398	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Medochemie Limited	50						
1580947	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Medochemie Limited	50						
1659988	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Krka d.d. Novo mesto	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1660003	tsefuroksiim, 500mg	J01DC02	FUROCEF, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1073641	tselekoksiib, 100mg	M01AH01	CELEBREX, kõvakapsel, 20TK	Pfizer Europe MA EEIG	50						
1596719	tselekoksiib, 100mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1596797	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
1815443	tselekoksiib, 200mg	M01AH01	ACLEXA, kõvakapsel, 30TK	First Pharma OÜ	50						
1684560	tseritiniib, 150mg	L01XE28	ZYKADIA, kõvakapsel, 150TK	Novartis Europharm Limited	100	C34-C34	Onkoloog				anaplastilise lümfoomkinaaspositiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele
1077836	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ZYRTEC, tablett, 30TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1098918	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1121870	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	ACETERIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
1430750	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
1430772	tsetirisiin, 10mg	R06AE07	CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK	VITABALANS OY	50						
1022869	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	UCB Pharma Oy Finland	50						
1728637	tsetirisiin, 10mg 1ml	R06AE07	ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK	Globalex Pharma OÜ	50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043356	tsetroreliks, 0,25mg	H01CC02	CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Merck Europe B.V.	100	N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9				41,00	kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks
					50						
1667370	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Teva B.V.	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1667538	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815656	tsinakaltseet, 30mg	H05BX01	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1667572	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815689	tsinakaltseet, 60mg	H05BX01	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
					50						
1667606	tsinakaltseet, 90mg	H05BX01	CINACALCET ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare B.V.	50						
					100	N18-N18	Nefroloog, Pediaater				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1815713	tsinakaltseet, 90mg	H05BX01	CINACALCET ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	50						
					100	N18-N18	Pediaater, Nefroloog				hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud
1196388	tsink, 25mg	A16AX05	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Recordati Rare Diseases	100	E83.0-E83.0	Gastroenteroloog, Neuroloog	esmane			
1196377	tsink, 50mg	A16AX05	WILZIN, kõvakapsel, 250TK	Recordati Rare Diseases	100	E83.0-E83.0	Gastroenteroloog, Neuroloog	esmane			
1005488	tsiprofloksatsiin, 250mg	J01MA02	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
1042827	tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml	S01AE03	CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK	SIA Novartis Baltics	50						
1005545	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
1223929	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPROFLOXACIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	E84-E84	Pediaater, Pulmonoloog				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1500994	tsiprofloksatsiin, 500mg	J01MA02	CIPROFLOXACIN OLAINFARM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	JSC Olainfarm	100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					100	E84-E84	Pulmonoloog, Pediaater				
					50						
1218361	tsitalopraam, 10mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1083563	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALEC 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1112937	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CIRAL 20 MG, kaetud tablett, 28TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1185409	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Actavis Group PTC ehf	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1218462	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1443631	tsitalopraam, 20mg	N06AB04	CITALOPRAM VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1218563	tsitalopraam, 40mg	N06AB04	CITALOPRAM - TEVA 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Teva Pharma B.V.	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1443697	tsitalopraam, 40mg	N06AB04	CITALOPRAM VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	VITABALANS OY	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1021790	tsüklofosfamiid, 50mg	L01AA01	ENDOXAN, kaetud tablett, 50TK	Baxter Oncology GmbH	50						
					75	M45-M46, M08-M08, M30-M35, M05-M06	Reumatoloog, Pediaater				
					100	C00-D48	Hematoloog, Onkoloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
1123760	tsüklopentolaat, 10mg 1ml	S01FA04	CYCLOGYL, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK	S.A. ALCON-COUVREUR N.V.	50						silmahaiguste ambulatoorseks raviks
1008559	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	SIA Novartis Baltics	75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5					
					75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Reumatoloog, Pediaater				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1098840	tsüklosporiin, 100mg	L04AD01	EQUORAL 100 MG, pehmekapsel, 50TK	Teva B.V.	75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					75	L40-L40	Reumatoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5					
					100	D46-D46	Hematoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1683097	tsüklosporiin, 1mg 1ml	S01XA18	IKERVIS, silmatilgad, emulsioon, 0.3ml 30TK	Santen Oy	75	H04.1-H04.1, M35.0-M35.0	Oftalmoloog				raske kuiva silma sündroomiga patsientidele, kellel on vaatamata vähemalt kolm kuud kestnud ravile niisutavate tilkadega punktkeratopaatia või konjunktiivi punktitaoline värvumine. Ravivastust hinnatakse peale kolme ravikuud alates esimese soodusretsepti kirjutamist ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult sarvkesta ja/või konjunktiivi värvumine ravi mõjul oluliselt paranenud või subjektiivsed kaebused oluliselt vähenenud.

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008526	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	SIA Novartis Baltics	75	L40-L40	Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					50						
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5					
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
1098828	tsüklosporiin, 25mg	L04AD01	EQUORAL 25 MG, pehmekapsel, 50TK	Teva B.V.	100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					75	L40-L40	Pediaater, Reumatoloog, Dermatoveneroloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					100	D60-D64	Hematoloog, Pediaater				
					50						
					75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008548	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK	SIA Novartis Baltics	100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5					
					75	N00-N08	Nefroloog, Pediaater				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					75	L40-L40	Reumatoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Reumatoloog, Pediaater				
					75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					50						
1098839	tsüklosporiin, 50mg	L04AD01	EQUORAL 50 MG, pehmekapsel, 50TK	Teva B.V.	75	N00-N08	Pediaater, Nefroloog				
					100	Z94-Z94, T86-T86					
					75	M30-M35, M05-M08, M45-M46	Pediaater, Reumatoloog				
					75	L50.8-L50.9, L50.1-L50.5					
					50						
					75	L20-L20	Dermatoveneroloog				
					75	L40-L40	Dermatoveneroloog, Pediaater, Reumatoloog				
					100	D46-D46	Hematoloog				
					100	D60-D64	Pediaater, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1064124	tsüproteroon, 50mg	G03HA01	ANDROCUR, tablett, 50TK	Bayer AG	50						
					100	C61-C61	Uroloog, Onkoloog				juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)
1014488	tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg	G03HB01	DIANE, kaetud tablett, 21TK	Bayer AG	50						
1557435	ulipristaal, 5mg	G03XB02	ESMYA, tablett, 28TK	Gedeon Richter Plc.	75	D25-D25	Günekoloog				patsientidele, kes soovivad rasestuda või kellele on kirurgiline ravi vastunäidustatud ning kirurgilise ravi eelselt fibroomi mõõtmete vähendamiseks
					50						
1646940	umeklidiinium, 55mcg 1annust	R03BB07	INCRUSE ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			
1016985	ursodeoksükoolhape, 250mg	A05AA02	URSOSAN, kõvakapsel, 50TK	PRO.MED.CS Praha a.s.	50						
					75	K74-K74, K73-K73	Gastroenteroloog, Pediaater				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1709401	ursodeoksükoolhape, 250mg	A05AA02	URSOGRIX, kõvakapsel, 50TK	AS Grindeks	75	K73-K74	Gastroenteroloog, Pediaater				
					50						
1301094	valatsikloviir, 1000mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1016301	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
1300936	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	Actavis Group PTC ehf	50						
1369593	valatsikloviir, 500mg	J05AB11	VALACICLOVIR ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK	SIA ELVIM	50						
1043592	valproehape, 150mg	N03AG01	CONVULEX 150 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076419	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1108246	valproehape, 150mg	N03AG01	ORFIRIL 150, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1043604	valproehape, 300mg	N03AG01	CONVULEX 300 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK	G.L. Pharma GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1077308	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1086555	valproehape, 300mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 300 mg, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1108257	valproehape, 300mg	N03AG01	ORFIRIL 300, gastroresistentne tablett, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1076341	valproehape, 500mg	N03AG01	ORFIRIL LONG 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK	Desitin Arzneimittel GmbH	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1086544	valproehape, 500mg	N03AG01	DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	sanofi-aventis Estonia OÜ	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1224672	valproehape, 500mg	N03AG01	VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
1043581	valproehape, 50mg 1ml	N03AG01	CONVULEX, siirup, 100ml 1TK	G.L. Pharma GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1108268	valproehape, 600mg	N03AG01	ORFIRIL 600, gastroresistentne tablett, 50TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
					100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
1025536	valproehape, 60mg 1ml	N03AG01	ORFIRIL SAFT, suukaudne lahus, 250ml 1TK	Desitin Arzneimittel GmbH	100	F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31	Psühhiaater	esmane			
					100	G40-G40	Neuroloog	esmane			
					50						
1092844	valsartaan, 160mg	C09CA03	DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	SIA Novartis Baltics	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1250378	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1250389	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1434495	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1515057	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1515079	valsartaan, 160mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1421233	valsartaan, 320mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1250323	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1434473	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1514854	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Medochemie Limited	50						
					75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
1514876	valsartaan, 80mg	C09CA03	VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Medochemie Limited	75	I15-I15, I50-I50, I10-I13					
					50						
1675324	valsartaan+amlodipiin, 160mg+10mg	C09DB01	WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1675234	valsartaan+amlodipiin, 160mg+5mg	C09DB01	WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1324314	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 160mg+12,5mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1434518	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 160mg+12,5mg	C09DA03	VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	50						
					75	I10-I13, I15-I15					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1324235	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 160mg+25mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	I10-I13, I15-I15					
					50						
1457557	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 320mg+12,5mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1324156	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA03	VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1434530	valsartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg	C09DA03	VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Zentiva, k.s.	75	I10-I13, I15-I15					
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704181	valsartaan+sakubitriil, 102,8mg+97,2mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50	Kardioloog, Sisearst	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=35%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704147	valsartaan+sakubitriil, 25,7mg+24,3mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50	Sisearst, Kardioloog	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=35%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1704169	valsartaan+sakubitriil, 51,4mg+48,6mg	C09DX04	ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK	Novartis Europharm Limited	75	I50-I50	Sisearst, Kardioloog	esmane			täiskasvanud patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=35%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud Euroopa ravijuhendi järgse AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidiretseptori antagonisti lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1008335	varfariin, 3mg	B01AA03	MAREVAN, tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					75	I47-I49					
					100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
1008368	varfariin, 5mg	B01AA03	MAREVAN FORTE, tablett, 100TK	Orion Corporation	50						
					75	I47-I49					
					100	I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0					
1734421	venetoklaks, 100mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis rituksimabiga kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib alates 5. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi venetoklaksiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2020

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734432	venetoklaks, 100mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis rituksimabiga kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib alates 5. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi venetoklaksiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2020
1734443	venetoklaks, 100mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis rituksimabiga kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib alates 5. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi venetoklaksiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2020

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1734397	venetoklaks, 10mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis rituksimabiga kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib alates 5. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi venetoklaksiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2020
1734410	venetoklaks, 50mg	L01XX52	VENCLYXTO, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	100	C91.1-C91.1	Hematoloog				kombinatsioonis rituksimabiga kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks patsientidele, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib alates 5. ravinädalast ega laiene patsientidele, kelle ravi venetoklaksiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.07.2020
1232468	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
					50						
1261741	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Medochemie Ltd	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1306325	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAGAMMA 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					75	G43-G43					
1316405	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ARGOFAN 150 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1435205	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	SIA ELVIM	75	G43-G43					
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
1786833	venlafaksiin, 150mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	First Pharma OÜ	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1232266	venlafaksiin, 37,5mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	75	G43-G43					
					50						
					100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
1232367	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Krka d.d. Novo mesto	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1261684	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	Medochemie Ltd	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1306246	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAGAMMA 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK	Wörwag Pharma GmbH & Co.KG	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1316371	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	ARGOFAN 75 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK	Zentiva, k.s.	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1435182	venlafaksiin, 75mg	N06AX16	VENLAFAXINE ELVIM, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK	SIA ELVIM	100	F33.2-F33.3, F32.2-F32.3	Psühhiaater	esmane			
					50						
					75	G43-G43					
1073157	verapamiil, 120mg	C08DA01	ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Mylan Healthcare SIA	50						
					75	I10-I13, I15-I15					
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
1073180	verapamiil, 240mg	C08DA01	ISOPTIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK	Mylan Healthcare SIA	75	I10-I13, I15-I15					
					75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
1073405	verapamiil, 80mg	C08DA01	VERAPAMIL- RATIOPHARM 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK	ratiopharm GmbH	75	I47-I49	Kardioloog, Pediaater	esmane			
					50						
					75	I10-I13, I15-I15					
1552856	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1762499	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1798577	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1799309	VIII hüübimisfaktor, 1000RÜ	B02BD02	BERIATE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1552867	VIII hüübimisfaktor, 1500RÜ	B02BD02	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1762501	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD02	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1799310	VIII hüübimisfaktor, 2000RÜ	B02BD02	BERIATE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1552834	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD02	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1799286	VIII hüübimisfaktor, 250RÜ	B02BD02	BERIATE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1552845	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	ADVATE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Takeda Manufacturing Austria AG	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1762477	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1798566	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Novo Nordisk A/S	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1799297	VIII hüübimisfaktor, 500RÜ	B02BD02	BERIATE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK	CSL Behring GmbH	100	D66-D66	Pediaater, Hematoloog				
1632361	vilanterool+flutikasoonfuroaat, 22mcg+184mcg 1annust	R03AK10	RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J45-J45					

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1632338	vilanterool+flutikasoonfuroaat, 22mcg+92mcg 1annust	R03AK10	RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					75	J45-J45					
1649224	vilanterool+umeklidiinium, 22mcg+55mcg 1annuses	R03AL03	ANORO ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	50						
					75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1756436	vilanterool+umeklidiinium+flutikasoonfuroaat, 22mcg+55mcg+92mcg 1annust	R03AL08	TRELEGY ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	75	J43-J44	Pulmonoloog	esmane			C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/µL ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga
					50						
1316326	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	GALVUS, tablett, 60TK	Novartis Europharm Limited	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1712438	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	SAXOTIN, tablett, 60TK	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1714160	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	DALMEVIN, tablett, 60TK	Medochemie Limited	75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
					50						

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1729436	vildagliptiin, 50mg	A10BH02	GLYPVILO, tablett, 60TK	Krka d.d. Novo mesto	50						
					75	E14-E14, E11-E11					II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud
1038091	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 375RÜ+500RÜ	B02BD06	IMMUNATE 500 RÜ/375 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.0-D68.0, D68.4-D68.4, D66-D66	Hematoloog, Pediaater				
1349232	von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 750RÜ+1000RÜ	B02BD06	IMMUNATE 1000 RÜ/750 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK	Baxalta Innovations GmbH	100	D68.0-D68.0, D68.4-D68.4, D66-D66	Pediaater, Hematoloog				

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1107975	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VFEND, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Pfizer Europe MA EEIG	100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B48.8-B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
1561823	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VORICONAZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK	Teva Pharma B.V.	100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
					100	B45-B45, B48.2-B48.2, B48.8-B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1615902	vorikonasool, 200mg	J02AC03	VORICONAZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Accord Healthcare S.L.U.	100	B45-B45, B48.2-B48.2, B48.8-B48.8, B37-B37					väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud
					100	B44-B44					patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas
1031746	östradiool, 100mcg 1g	G03CA03	LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1380721	östradiool, 10mcg	G03CA03	VAGIFEM, vaginaaltablett, 18TK	Novo Nordisk A/S	50						
1030442	östradiool, 1mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
1063415	östradiool, 1mg 1g	G03CA03	DIVIGEL, transdermaalne geel, 1g 28TK	Orion Corporation	50						
1030431	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	Novo Nordisk A/S	50						
					100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Endokrinoloog, Günekoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana

Ravimi-kood	Toimeaine, toimeaine sisaldus	ATC kood	Ravim, pakendi suurus	Müügiloa hoidja	Soodus-tus %	Diagnoos	Eriala	Esmane	Vanus üle	Vanus alla	Märkused
1684111	östradiool, 2mg	G03CA03	ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK	First Pharma OÜ	100	E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97	Günekoloog, Endokrinoloog	esmane		50,00	haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana
					50						
1031735	östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g	G03CA80	LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK	Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel	50						
1022634	östriool, 500mcg	G03CA04	OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK	Aspen Pharma Trading Limited	50						